




Что такое ТАСИГНА®

Название препарата	Описание
Нилотиниб	Желатиновая капсула 150 мг: красная Желатиновая капсула 200 мг: жёлтая 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. желатиновых капсул 150 мг и (или) желатиновых капсул 200 мг.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

В установленное время. С промежутком времени между приёмом лекарства и приёмом пищи (за 1 час до еды или через 2 часа после еды).

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

2 раза в день, в установленное время, за 1 час до еды или через 2 часа после еды		< 1 ч		2 ч >		< 1 ч		2 ч >		< 1 ч		2 ч >
Без перерыва										...		Д28
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7					

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, уровня электролитов, таких как калий, глюкозы крови, холестерина, функции печени и поджелудочной железы), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление, электрокардиограмма).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ТАСИГНОЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ТАСИГНЫ® следует избегать употребления зверобоя, грейпфрута, больдо, фукуса, азиатского женьшеня, пассифлоры.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: тошнота, рвота, диарея, запор и боль в животе</p> <p>Общие расстройства: отёчность конечностей и (или) лица</p> <p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: низкое содержание тромбоцитов (тромбоцитопения), многоядерных нейтрофилов (нейтропения), низкий уровень гемоглобина (анемия), отклонение от нормы печеночных проб и проб поджелудочной железы, повышенный уровень холестерина и триглицеридов</p> <p>Боль: боль в мышцах и суставах, головные боли</p> <p>Проблемы с кожей: кожная сыпь, сухость кожи, зуд и выпадение волос</p> <p>Нарушения работы сердца: сильное, быстрое или нерегулярное сердцебиение, одышка, боль в груди</p> <p>Усталость</p>
Некоторые пациенты требуют особого внимания	<p>Пациенты – носители вируса гепатита Б</p> <p>Пациенты с аритмией в анамнезе</p>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов > Стул реже 3 раз в неделю <p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой <p>Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли > Боли в суставах <p>Симптомы, свидетельствующие об удержании воды</p> <ul style="list-style-type: none"> Быстрое и неожиданное увеличение веса <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца</p> <ul style="list-style-type: none"> Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Уход за кожей	<p>Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием.</p> <p>Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу.</p> <p>Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.</p>
Вес	При расстройствах пищеварения или удержании воды регулярно проверяйте свой вес.
Удержание воды (отёки конечностей)	Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Кладите ноги в возвышенное положение.
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Запор	Для стимулирования кишечного транзита занимайтесь подобранной и регулярной физической нагрузкой.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Боль в суставах	Занимайтесь соответствующими видами физической нагрузки.
Выпадение волос	Используйте небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). Делайте выбор в пользу мягкой щётки. Избегайте слишком частого мытья волос. Избегайте источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Удержание воды	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием соли.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте побольше воды.
Проблемы с функцией поджелудочной железы	Избегайте употребления алкоголя.

