




## Что такое ВОТРИЕНТ®

Название препарата	Описание
Пазопаниб	<p>Таблетка 200 мг: розовая, овальная Таблетка 400 мг: белая, овальная</p> 

## Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: ..... мг в день, т.е. ....таблеток 200 мг и (или) ..... таблеток 400 мг, принимать один раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

В установленное время, с промежутком времени между приёмом лекарства и приёмом пищи (за 1 час до еды или через 2 часа после еды)

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

## Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, за 1 ч до еды или через 2 ч после еды									
	< 1 ч — 2 ч >	< 1 ч — 2 ч >	< 1 ч — 2 ч >						
Без перерыва									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28

## Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

## Что ещё нужно знать?

### Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, функции печени, почек и щитовидной железы, уровня калия; анализ мочи на определение белка), а также мониторинг клинического состояния (электрокардиограмма, артериальное давление, УЗИ сердца).

### Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

### Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ВОТРИЕНТОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

*Пример:* При приёме ВОТРИЕНТА® следует избегать употребления зверобоя и грейпфрутового сока.

## Каковы возможные побочные явления?

**Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.**

### ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p><b>Нарушения пищеварения:</b> диарея, тошнота, потеря веса, рвота, нарушение вкусового восприятия, воспаления во рту (язвы), боли в животе, потеря аппетита</p> <p><b>Проблемы с кожей:</b> изменение цвета волос и кожи, кожная сыпь, воспаление ладоней, ступней и участков трения, выпадение волос (умеренное)</p> <p><b>Боли:</b> головные боли и прочие боли</p> <p><b>Отклонения в результатах лабораторных анализов:</b> отклонение от нормы печёночных проб, низкое содержание лейкоцитов (лейкопения), многоядерных нейтрофилов (нейтропения), тромбоцитов (тромбоцитопения), и наличие белка в моче</p> <p><b>Сосудистые расстройства:</b> кровотечения, повышенное артериальное давление</p> <p><b>Прочие:</b> усталость, расстройство сна, проблемы со зрением</p>
------------------------	---

**О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?**

Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p><b>Нарушения пищеварения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Существенная и (или) быстрая потеря веса</li> <li>&gt; Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки</li> <li>&gt; Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи</li> <li>&gt; Сильная боль в животе</li> <li>&gt; Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов</li> <li>&gt; Выделения, нарыв или боль в заднем проходе</li> </ul> <p><b>Симптомы, свидетельствующие о гипертонии</b></p> <p>Головные боли, шум в ушах и (или) головокружения</p> <p>Увеличение показателей артериального давления</p> <p><b>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</b></p> <p>Температура &gt; 38,5 °C</p> <p>Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой</p> <p><b>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии</b></p> <p>Кровь в стуле или в рвотных массах</p> <p>Гематомы (синяки), носовые кровотечения</p> <p><b>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца или о флебите</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди, потеря сознания, отёчность ног</li> <li>&gt; Слабость в одной стороне тела, сильные головные боли, судороги, спутанность сознания, трудности с речью, изменения зрения или сильные головокружения</li> <li>&gt; Красная, горячая и болезненная икра</li> </ul> <p><b>Симптомы, свидетельствующие об отёке мозга</b></p> <p>Головные боли, спутанность сознания, судороги или проблемы со зрением</p> <p><b>Респираторные заболевания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание</li> </ul>
--	--

**КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?**

Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется <b>регулярно измерять артериальное давление</b> . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Вес	При расстройствах пищеварения или отёках <b>регулярно проверяйте свой вес</b> .
Уход за кожей и волосами	<p><b>На кистях рук и стопах:</b> <b>Наносите</b> крем или увлажняющее молочко, и (или) заживляющий крем на кисти рук и стопы (не втирая сильно).</p> <p><b>Не подвергайте</b> кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). <b>Избегайте</b> действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. <b>Избегайте</b> слишком тесной одежды, носков и обуви.</p> <p><b>Тело:</b> <b>Делайте выбор в пользу</b> мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. <b>Избегайте</b> использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. <b>Для защиты от солнца используйте</b> крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и <b>избегайте</b> воздействия солнечных лучей.</p> <p><b>Для защиты от солнца используйте</b> крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и <b>избегайте</b> воздействия солнечных лучей.</p> <p><b>Волосы:</b> <b>Используйте</b> небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). <b>Делайте выбор в пользу</b> мягкой щётки. <b>Избегайте</b> слишком частого мытья волос. <b>Избегайте</b> источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки.</p>
Гигиена полости рта	<b>Используйте</b> мягкую зубную щетку, <b>используйте</b> ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. <b>Избегайте</b> ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Кровотечения / кровоизлияния	<b>Избегайте</b> принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) <b>Сообщите</b> своему врачу: > о приёме <b>антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов:</b> необходим тщательный мониторинг > о случаях <b>хирургического или стоматологического вмешательства</b> .
Инфекция	<b>Избегайте</b> посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...). Вам может быть <b>рекомендована прививка</b> от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.

**КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?**



Диарея	<b>Делайте выбор в пользу</b> диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно <b>употреблять</b> продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. <b>Избегайте</b> употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. <b>Пейте</b> побольше воды.
Потеря веса	<b>Делайте выбор в пользу</b> более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Тошнота	<b>Делайте выбор в пользу</b> дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. <b>Ограничьте</b> потребление жирной, жареной и острой пищи.
Воспаление во рту (язвы)	<b>Избегайте</b> употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.
Нарушения вкусового восприятия	<b>Делайте выбор в пользу</b> нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день. <b>Избегайте</b> употребления металлических кухонных принадлежностей.

