




## Що таке ІКЛУСИГ®

Назва препарату	Опис
Понатиніб	Пігулки 15 мг, 30 мг та 45 мг: білі, круглі 

## Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.









У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто ..... пігулок 15 мг та (чи) ..... пігулок 30 мг та (чи) ..... пігулочок 45 мг, приймати 1 раз на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

У встановлений час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

## Дозування – схема приймання

Один раз на день, у встановлений час, з їжею чи без їжі									
Без перерви	 Д1	 Д2	 Д3	 Д4	 Д5	 Д6	 Д7	...	 Д28

## Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

## Що ще треба знати?

### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції печінки та підшлункової залози, рівня глюкози крові та холестерину), а також моніторинг клінічного стану (артеріальний тиск, електрокардіограма).

### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ІКЛУСИГОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

**Приклад:** При прийманні ІКЛУЗИГУ® слід уникати вживання звіробію та грейпфруту. Уникайте приймати ліки від підвищеної кислотності.

## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**

### ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Найбільш поширені	<p><b>Порушення травлення:</b> нудота, блювота, діарея, закріп та втрата апетиту</p> <p><b>Загальні розлади:</b> утримання води, запаморочення, стомленість</p> <p><b>Відхилення в результатах лабораторних досліджень:</b> низький рівень тромбоцитів (тромбоцитопенія) та (чи) багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія), низький рівень гемоглобіну (анемія), відхилення від норми печінкових проб та (чи) проб підшлункової залози</p> <p><b>Біль:</b> болі у кістках, м'язах та суглобах, головні болі</p> <p><b>Проблеми зі шкірою:</b> шкірний висип, свербіж</p> <p><b>Респіраторні захворювання:</b> інфекція, кашель, утруднене дихання</p> <p><b>Порушення роботи серця,</b> в тому числі високий артеріальний тиск</p> <p><b>Інші:</b> кровотечі, стомленість та розлади сну</p>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	Пацієнти – носії вірусу гепатита Б Хворі на цукровий діабет (ризик гіперглікемії)
<b>ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?</b>	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p><b>Порушення травлення</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Суттєва та (або) швидка втрата ваги</li> <li>&gt; Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу</li> <li>&gt; Сильний біль у животі</li> <li>&gt; Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин</li> <li>&gt; Випорожнення рідше 3 разів на тиждень</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Температура &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про крововилив</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Кров у випорожненні чи у блювотних масах</li> <li>Гематоми (синці), носові кровотечі</li> </ul> <p><b>Респіраторні захворювання:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Постійний посилюючий кашель чи утруднене дихання</li> </ul> <p><b>Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Головні болі та (чи) біль у суглобах</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про утримання води</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Швидке та несподіване збільшення ваги</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця чи судин</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення</li> <li>&gt; Збільшення показників артеріального тиску</li> <li>&gt; Задишка, прискорене серцебиття, біль або стиснення в грудях</li> <li>&gt; Червона, гаряча та болісна ікра</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про неврологічні розлади</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Слабкість в одному боці тіла, сильні головні болі, судоми, сплутаність свідомості, труднощі з розмовою, зміни зору або сильні запаморочення</li> </ul>
<b>ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?</b>	
Догляд за шкірою	<b>Робіть вибір на користь</b> м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. <b>Уникайте</b> використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <b>Для захисту від сонця використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.
Вага	При розладах травлення або утриманні води <b>регулярно перевіряйте свою вагу.</b>
Утримання води (набряки кінцівок)	<b>Уникайте</b> занадто тісного одягу, шкарпеток та взуття. <b>Кладіть</b> ноги у високе положення.
Інфекція	<b>Не забувайте</b> про антибіотик, який призначив Ваш лікар. <b>Уникайте</b> відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить.
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується <b>регулярно вимірювати</b> артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Стомленість / біль в суглобах / закріп	<b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.
Кровотечі	<b>Уникайте</b> приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...) <b>Повідомте</b> свого лікаря: > якщо ви приймаєте <b>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти:</b> необхідний ретельний моніторинг > про випадки <b>хірургічного чи стоматологічного</b> втручання.
<b>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</b>	
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль м'якоти, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Утримання води	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низькою кількістю солі.
Закріп	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з високим вмістом клітковини. <b>Пийте</b> більше води.

