



Що таке Пралсетиніб - ГАВРЕТО®

Назва препарату	Опис
Пралсетиніб	Желатинова капсула 100 мг: блакитна

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке:мг/день, тобто....желатинових капсул 100 мг, один раз на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відкриваючи та не розчиняючи капсули.

У встановлений час, з проміжком часу між прийомом ліків та прийомом їжі (за 1 годину до їжі або через 2 години після їжі).

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

Один раз на день, у встановлений час, натще									
Без перерви									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в лікарняній аптеці.

Для його отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові, функції печінки та нирок), а також моніторинг клінічного стану (артеріальний тиск).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між Пралсетинібом - ГАВРЕТО® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ГАВРЕТО® слід уникати вживання грейпфрутового соку, звіробою, гінкго, фенхелю, куркуми, больдо, шавлія, ехінацеї.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

ПОБІЧНІ ЯВИЩА	
Найбільш поширені	<p>Порушення травлення: закріп, діарея, сухість у роті</p> <p>Загальні розлади: втома, підвищена температура, набряк кінцівок</p> <p>Біль: біль у м'язах</p> <p>Проблеми, які стосуються серцево-судинної системи: гіпертонія</p> <p>Відхилення в результатах лабораторних досліджень: зниження рівня гемоглобіну (анемія) та (чи) кількості лімфоцитів (лімфопенія), зниження кількості багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія), відхилення від норми печінкових та (чи) ниркових проб, зниження рівня кальція та натрію</p> <p>Респіраторні захворювання: інфекція, кашель</p>

ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?



<p>Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій</p>	<p>Порушення травлення</p> <ul style="list-style-type: none"> > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Сильний біль у животі > Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин > Випорожнення рідше 3 разів на тиждень <p>Симптоми, що свідчать про гіпертонію</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення > Збільшення показників артеріального тиску <p>Симптоми, що свідчать про інфекцію</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою <p>Респіраторні захворювання</p> <ul style="list-style-type: none"> > Посилення постійного кашлю чи утруднене дихання <p>Симптоми, що свідчать про крововилив</p> <ul style="list-style-type: none"> > Блідість, значна стомленість > Кров у випорожненні чи у блювотних масах Гематоми (синці), носові кровотечі <p>Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головні болі > Біль у м'язах
<p>ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?</p>	
<p>Вага</p>	<p>При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу.</p>
<p>Контроль за тиском</p>	<p>Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.</p>
<p>Стомленість</p>	<p>Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт...</p> <p>Чергуйте періоди активності та відпочинку.</p>
<p>Закріп</p>	<p>Для стимулювання кишечного транзиту займайтеся підібраними та регулярними видами фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт...</p>
<p>Кровотечі</p>	<p>Уникайте приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...)</p> <p>Повідомте свого лікаря:</p> <ul style="list-style-type: none"> > якщо ви приймаєте <i>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти</i>: необхідний ретельний моніторинг > про випадки <i>хірургічного чи стоматологічного</i> втручання.
<p>Інфекція</p>	<p>Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить</p>
<p>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</p>	
<p>Діарея</p>	<p>Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль мorkву, банани.</p> <p>Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю.</p> <p>Пийте більше води.</p>
<p>Закріп</p>	<p>Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте більше води.</p>
<p>Втрата апетиту</p>	<p>Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».</p>
<p>Нудота</p>	<p>Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв.</p> <p>Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.</p>
<p>Сухість у роті</p>	<p>Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.</p>

