



Что такое Пралсетиниб - ГАВРЕТО®

Название препарата	Описание
Пралсетиниб	Желатиновая капсула 100 мг: голубая

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:мг/день, т.е.желатиновая(ые) капсула(ы) 100 мг, один раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

В установленное время, вне еды (за 1 час до еды или через 2 часа после еды).

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма



Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в больничной аптеке.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, функции печени и почек), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между Пралсетинибом - ГАВРЕТО® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ГАВРЕТО® следует избегать употребления грейпфрутового сока, зверобоя, гинкго, фенхеля, куркумы, больдо, шалфея, эхинацеи.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: запор, диарея, сухость во рту</p> <p>Общие расстройства: усталость, повышенная температура, отёк конечностей</p> <p>Боли: мышечные боли</p> <p>Проблемы, относящиеся к сердечно-сосудистой системе: гипертензия</p> <p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: снижение гемоглобина (анемия) и (или) количества лимфоцитов (лимфопения), низкое содержание многоядерных нейтрофилов (нейтропения), отклонение от нормы печёночных и (или) почечных проб, низкий уровень кальция и натрия</p> <p>Респираторные заболевания: инфекция, кашель</p>



О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<ul style="list-style-type: none"> > Нарушения пищеварения > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов > Стул реже 3 раз в неделю Симптомы, свидетельствующие о гипертонии > Головные боли, шум в ушах и (или) головокружение > Увеличение показателей артериального давления Симптомы, свидетельствующие об инфекции > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой Респираторные заболевания > Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии > Бледность, значительная усталость > Кровь в стуле или в рвотных массах > Гематомы (синяки), носовые кровотечения Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью > Головные боли > Мышечная боль
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес.
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Запор	Для стимулирования кишечного транзита занимайтесь подобранной и регулярной физической нагрузкой: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт...
Кровотечения	Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: > о приёме антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов : необходим тщательный мониторинг о случаях хирургического или стоматологического вмешательства .
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми, ...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте побольше воды.
Потеря аппетита	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Сухость во рту	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.

