




## Що таке СУТЕНТ®

Назва препарату	Опис
Сунітиніб	<p>Желатинова капсула 12,5 мг: червона Желатинова капсула 25 мг: помаранчева з червоним Желатинова капсула 50 мг: помаранчева</p> 

## Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: ..... мг/день, тобто ..... желатинових капсул 12,5 мг, ..... желатинових капсул 25 мг та (або) ..... желатинових капсул 50 мг, приймати один раз на день.

..... (вказіть, приймати безперервно чи ні).

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відкриваючи та не розчиняючи капсули.

У встановлений час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

## Дозування – схема приймання

Один раз на день, у встановлений час, з їжею чи без їжі									
Без перерви ЧИ з Д1 по Д28, кожні 6 тижнів	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28
			Д1		Д28	Д29		Д42	

## Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

## Що ще треба знати?

### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції печінки, підшлункової залози та щитовидної залози, аналіз сечі на наявність білка), а також моніторинг клінічного стану (артеріальний тиск, електрокардіограма, сцинтиграфія серця).

### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між СУТЕНТОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

*Приклад:* При прийманні СУТЕНТА® слід уникати вживання звіробію, грейпфрутового соку, гінкго білоба, померанця, рускусу колючого, солодки, йохимбе.



## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**

ПОБІЧНІ ЯВИЩА	
Найбільш поширені	<p><b>Порушення травлення:</b> втрата апетиту, порушення смакового сприйняття, нудота, запалення у роті (виразки), кислотний рефлюкс, блювота</p> <p><b>Порушення роботи серця,</b> у тому числі гіпертонія</p> <p><b>Проблеми зі шкірою:</b> знебарвлення шкіри та (або) волосся, долонно-підшовний синдром, шкірні висипи, сухість</p> <p><b>Відхилення у результатах лабораторних досліджень:</b> порушення функції щитовидної залози (гіпотиреоз), низька кількість багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія) та тромбоцитів (тромбоцитопенія), низький рівень гемоглобіну (анемія), гіпоглікемія</p> <p><b>Болі:</b> кисті рук, стопи, суглоби, головний біль</p> <p><b>Проблеми з очима:</b> слюзи, набряклість (набряки)</p> <p><b>Інфекції</b></p> <p><b>Інші:</b> стомленість, розлад сну, запаморочення, кровотечі / крововиливи</p>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	Пацієнти з цукровим діабетом (гіпоглікемія)
ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p>&gt; <b>Порушення травлення</b></p> <p>&gt; Суттєва та (або) швидка втрата ваги</p> <p>&gt; Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу</p> <p>&gt; Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі</p> <p>&gt; Сильний біль у животі</p> <p>Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин</p> <p><b>Симптоми, що свідчать про гіпертонію:</b> Головні болі, шум у вухах та (або) запаморочення</p> <p><b>Симптоми, що свідчать про крововилив</b> Кров у випорожненні чи у блювотних масах</p> <p>Гематоми (синці), носові кровотечі</p> <p><b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b> Температура &gt; 38,5 °C</p> <p>Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою</p> <p><b>Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю</b></p> <p>&gt; Головний біль</p> <p>&gt; Біль у суглобах</p> <p><b>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця</b> Задишка, прискорене серцебиття, біль або стиснення в грудях</p> <p><b>Симптоми гіпоглікемії</b> Запаморочення, нудота, порушення зору, м'язова слабкість</p> <p><b>Симптоми, що свідчать про флебіт</b> &gt; Червона, гаряча та болісна ікра</p>
ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?	
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується <b>регулярно вимірювати</b> артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Вага	При розладах травлення <b>регулярно перевіряйте свою вагу.</b>
Гігієна порожнини рота	<b>Використовуйте</b> м'яку зубну щітку, <b>використовуйте</b> ополаскувачі для рота, що містять питну соду. <b>Уникайте</b> ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Догляд за шкірою	<p><b>На кистях рук і стопах:</b> <b>Нанесіть</b> зволожуючий крем або молочко, і (або) загоючий крем на кисті рук і стопи (не втираючи сильно).</p> <p><b>Уникайте</b> піддавати кисті рук і стопи дії високих температур (гарячої води). <b>Уникайте</b> видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. <b>Уникайте</b> носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття.</p> <p><b>Типо:</b> <b>Робіть вибір на користь</b> м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням.</p> <p><b>Уникайте</b> використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру.</p> <p><b>Для захисту від сонця використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.</p>
Стомленість	<b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.



Кровотечі / крововиливи	<b>Уникайте</b> приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...) <b>Повідомте</b> свого лікаря: > якщо ви приймаєте <i>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти</i> : необхідний ретельний моніторинг > про випадки <i>хірургічного чи стоматологічного</i> втручання.
Інфекція	Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить
<b>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</b>	
Втрата ваги	<b>Робіть вибір на користь</b> більш калорійної дієти та «дієти задоволення».
Порушення смакового сприйняття	<b>Робіть вибір на користь</b> кількох невеликих прийомів теплої та холодної їжі на день. <b>Уникайте</b> вживання металевого кухонного приладдя.
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль моркву, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Запалення у роті (виразки)	<b>Уникайте</b> вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.
Кислотний рефлюкс	<b>Уникайте</b> факторів ризику: алкоголь, тютюн, кава, рясна та жирна їжа. <b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування.

