




Что такое СУТЕНТ®

Название препарата	Описание
Сунитиниб	<p>Желатиновая капсула 12,5 мг: красная Желатиновая капсула 25 мг: оранжевая с красным Желатиновая капсула 50 мг: оранжевая</p> 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. желатиновых капсул 12,5 мг, желатиновых капсул 25 мг и (или) желатиновых капсул 50 мг, принимать один раз в день.

..... (укажите, принимать непрерывно или нет).

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

В установленное время, во время еды или вне еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, во время еды или вне еды										
Без перерыва ИЛИ с Д1 по Д28, каждые 6 недель									...	
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28	
						
			Д1		Д28	Д29		Д42		

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, функции печени, поджелудочной железы и щитовидной железы, анализ мочи на содержание белка), а также мониторинг клинического состояния (артериальное давление, электрокардиограмма, скintiграфия сердца).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между СУТЕНТОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме СУТЕНТА® следует избегать употребления зверобоя, грейпфрутового сока, гинкго билоба, померанца, иглицы колючей, солодки, йохимбе.

Каковы возможные побочные явления?



Программа ONCOLIEN Общества онкологической фармации Франции предоставляется в распоряжение в соответствии с условиями международной лицензии 4.0 «С указанием авторства — с сохранением условий». Основано на работе <https://oncolien.sfpo.com>. Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, можно получить на сайте <https://www.sfpo.com>

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: потеря аппетита, нарушение вкусового восприятия, тошнота, воспаления во рту (язвы), кислотный рефлюкс, рвота</p> <p>Нарушения работы сердца, в том числе гипертония</p> <p>Проблемы с кожей: обесцвечивание кожи и (или) волос, ладонно-подошвенный синдром, кожные высыпания, сухость</p> <p>Отклонения в результатах лабораторных анализов: нарушение функции щитовидной железы (гипотиреоз), низкое содержание многоядерных нейтрофилов (нейтропения), тромбоцитов (тромбоцитопения), низкий уровень гемоглобина (анемия), гипогликемия</p> <p>Боли: кисти рук, стопы, суставы, головные боли</p> <p>Проблемы с глазами: слёзы, отёчность (отёки)</p> <p>Инфекции</p> <p>Прочие: усталость, расстройство сна, головокружения, кровотечения / кровоизлияния</p>
Некоторые пациенты требуют особого внимания	Пациенты с диабетом (гипогликемия)
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>> Нарушения пищеварения</p> <p>> Существенная и (или) быстрая потеря веса</p> <p>> Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки</p> <p>> Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи</p> <p>> Сильная боль в животе</p> <p>> Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о гипертонии</p> <p>Головные боли, шум в ушах и (или) головокружения</p> <p>Увеличение показателей артериального давления</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии</p> <p>Кровь в стуле или в рвотных массах</p> <p>Гематомы (синяки), носовые кровотечения</p> <p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</p> <p>Температура > 38,5 °C</p> <p>Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой</p> <p>Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью</p> <p>> Головные боли</p> <p>> Боли в суставах</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца</p> <p>Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди</p> <p>Симптомы гипогликемии</p> <p>> Головокружения, тошнота, проблемы со зрением, мышечная слабость</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о флебите</p> <p>> Красная, горячая и болезненная икра</p>
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес .
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Уход за кожей	На кистях рук и стопах: Наносите крем или увлажняющее молочко, и (или) заживляющий крем на кисти рук и стопы (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Тело: Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.



Кровотечение / кровоизлияния	<p>Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...)</p> <p>Сообщите своему врачу:</p> <ul style="list-style-type: none"> > о приёме <i>антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов</i>: необходим тщательный мониторинг > о случаях <i>хирургического или стоматологического вмешательства</i>
Инфекция	Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Потеря аппетита	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Нарушения вкусового восприятия	Делайте выбор в пользу нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день. Избегайте употребления металлических кухонных принадлежностей.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Воспаление во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.
Кислотный рефлюкс	Избегайте факторов риска: алкоголь, табак, кофе, обильная и жирная еда. Делайте выбор в пользу дробного питания.

