



Что такое КСАГРИД®

Название препарата	Описание
Анагрелид	Желатиновая капсула 0,5 мг: белая Существуют непатентованные препараты различной формы

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. желатиновых капсул раз в день, каждый день.

Дозировка может меняться на протяжении всего лечения в зависимости от количества тромбоцитов.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

В установленное время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Принимать не менее 2 раз в день, в установленное время, едой или без еды									
Без перерыва									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, функции печени и почек, и уровня калия), а также мониторинг клинического состояния (электрокардиограмма).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между КСАГРИДОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме КСАГРИДА® следует избегать употребления грейпфрутового сока, зверобоя, больдо, фукуса, азиатского женьшеня, пассифлоры.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	Головные боли Нарушения работы сердца: сильное, учащённое или нерегулярное сердцебиение Общие расстройства: удержание воды Нарушения пищеварения: тошнота, диарея Прочие: кожная сыпь, усталость, анемия



О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?

Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций

Нарушения пищеварения

- > Существенная и (или) быстрая потеря веса
- > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки
- > Сильная боль в животе

Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца

- Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди
- > Отёчность ног (отёки)
- > Синеватые губы или кожа

Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии

- > Кровь в стуле или в рвотных массах
- Гематомы (синяки), носовые кровотечения

