



Что такое КАПРЕЛСА®

Название препарата	Описание
Вандетаниб	Таблетка 100 мг: белая, круглая Таблетка 300 мг: белая, овальная

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. таблеток мг, принимать один раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая и не разрезая таблетки. Таблетки можно диспергировать при перемешивании в течение 10 минут в половине стакана негазированной воды. ВЫПИТЬ незамедлительно. ПРОПОЛОСКАТЬ стакан и ВЫПИТЬ воду от полоскания.

В установленное время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, с едой или без еды										
Без перерыва										
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28	

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга функции щитовидной железы и печени, и ионограмма.), а также мониторинг клинического состояния (электрокардиограмма).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между КАПРЕЛСОЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме КАПРЕЛСЫ® следует избегать употребления зверобоя, грейпфрута, больдо, фукуса, азиатского женьшеня, померанца, пассифлоры, одуванчика, гинкго билоба, иглицы колючей, солодки, йохимбе.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: диарея, тошнота, потеря аппетита, рвота, кислотный рефлюкс</p> <p>Проблемы с кожей: кожные высыпания, чувствительность к солнцу, акне, зуд, сухость, аномалии ногтей</p> <p>Боль: усталость, головные боли, боли</p> <p>Инфекции: фарингит, синусит, ринит, инфекция мочевыводящих путей и т.д.</p> <p>Общие: расстройство сна, усталость, расстройства настроения, отёки</p> <p>Проблемы с глазами: проблемы со зрением</p> <p>Нарушение работы сердца, в том числе гипертония</p>
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о гипертонии > Головные боли, шум в ушах и (или) головокружения > Увеличение показателей артериального давления</p> <p>Нарушения пищеварения > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии > Кровь в стуле или в рвотных массах Гематомы (синяки), носовые кровотечения</p> <p>Респираторные заболевания Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание</p> <p>Проблемы с кожей Появление значительных волдырей или сильное отслоение кожи</p> <p>Симптомы, свидетельствующие об отёке мозга Головные боли, спутанность сознания, судороги или проблемы со зрением</p>
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Вес	При расстройствах пищеварения или отёках конечностей регулярно проверяйте свой вес.
Уход за кожей	На кистях рук и стопах: Наносите крем или увлажняющее молочко, и (или) заживляющий крем на кисти рук и стопы (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Тело: Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу.
Защита от солнца	КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО. Наносите крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра (SPF 50) и избегайте солнечного воздействия. Делайте выбор в пользу закрывающей одежды с длинными рукавами и с воротником, длинных брюк и шляп.
Ногти	Избегайте травм ногтей на руках и ногах. Избегайте использования лаков, за исключением защитного лака, специально рекомендованного Вам медперсоналом. Делайте выбор в пользу прямой формы ногтей и не подстригайте ногти слишком коротко.
Кровотечения / кровоизлияния	Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: > о приёме антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов: необходим тщательный мониторинг > о случаях хирургического или стоматологического вмешательства.
Инфекция	Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Отёки	Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Кладите ноги в возвышенное положение. Регулярно проверяйте свой вес.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте больше воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Кислотный рефлюкс	Избегайте факторов риска: алкоголь, табак, кофе, обильная и жирная еда. Делайте выбор в пользу дробного питания.
Потеря аппетита	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».

