



## Що таке ВЕНКЛІКСТО®

Назва препарату	Опис
Венетоклакс	Пігулка 10 мг: кругла, світло-жовта Пігулка 50 мг: овальна, бежева Пігулка 100 мг: овальна, світло-жовта

## Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: ..... мг/день, тобто ..... пігулок ..... мг 1 раз на день, щодня.

**Спочатку збільшення дози** на протязі ..... тижнів (від ..... до ..... мг з подвоюванням щотижня).

>Тиждень 1 ..... мг/день

>Тиждень 2 ..... мг/день

>Тиждень 3 ..... мг/день

>Тиждень 4 ..... мг/день

>Починаючи з тижня 5 ..... мг/день

Під час періоду підбору дози **пити 1,5 – 2 літри води на день.**

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи та не розжовуючи пігулки. У встановлений час, з їжею.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної.

## Дозування – схема приймання

Один раз на день, у встановлений час, з їжею										
Без перерви										
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28	

## Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

## Що ще треба знати?

### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції нирок та біохімічний аналіз крові), а також моніторинг клінічного стану.

### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ВЕНКЛІКСТО® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

**Приклад:** Уникайте вживання звіробою (звіробій продірявлений), шавлії, куркуми, перцевої м'яти, пасифлори, глоду у всіх його формах (капсула, смола, настій, краплі...), а також грейпфрута (сік, м'якоть), гіркого апельсина та карамболі.

## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**

### ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Найбільш поширені	<p><b>Порушення травлення:</b> нудота, блювота, діарея, закріп, біль в животі</p> <p><b>Стомленість</b></p> <p><b>Розлади сечовивідної системи:</b> інфекції сечовивідних шляхів, темна сеча, підвищення рівня креатиніну</p> <p><b>Респіраторні захворювання:</b> інфекції</p> <p><b>Відхилення в результатах лабораторних досліджень:</b> низький рівень гемоглобіну (анемія) та (чи) зниження кількості багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія)</p> <p><b>Синдром лізису пухлини:</b> підвищення рівня калію, фосфору та сечовини (гіперкаліємія, гіперфосфатемія, гіперурикемія). Зниження рівня кальцію (гіпокальціємія)</p>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	Пацієнти, які приймають антагоністи вітаміну К (рекомендується ретельний моніторинг міжнародного нормалізованого відношення)
<b>ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?</b>	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Порушення травлення</b></li> <li>&gt; Суттєва та (або) швидка втрата ваги</li> <li>&gt; Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу</li> <li>&gt; Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі</li> <li>&gt; Сильний біль у животі</li> <li>&gt; Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин</li> <li>&gt; Випорожнення рідше 3 разів на тиждень</li> <li>&gt; <b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b></li> <li>&gt; Температура &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою</li> <li>&gt; <b>Симптоми алергії</b></li> <li>&gt; Свербіж з висипом</li> <li>&gt; набряк обличчя, губ, язика та (або) горла, що викликає труднощі при ковтанні або диханні</li> <li>&gt; <b>Симптоми, що свідчать про синдром лізису:</b></li> <li>&gt; Фарбування сечі</li> <li>&gt; Зменшення кількості сечі, що виділяється</li> <li>&gt; Біль у боці під ребрами</li> </ul>
<b>ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?</b>	
Інфекція	<b>Уникайте</b> відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить
Безпліддя	Перед початком лікування <b>дізнайтеся</b> у свого лікаря про способи збереження сперми.
Закріп	<i>Для стимулювання кишечного транзиту <b>займайтеся</b> підібраними та регулярними видами фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт...</i>
Стомленість	<b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.
Догляд за шкірою	<i>Для захисту від сонця <b>використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.</i>
Поводження з протираковим препаратом	<b>Уникайте</b> контакту капсул зі шкірою. Носіть рукавички та мийте руки після поведження з препаратом.
<b>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</b>	
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль моркви, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Закріп	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з високим вмістом клітковини. <b>Пийте</b> більше води.

