




Що таке ЕРІВЕДЖ®

Назва препарату	Опис
Вісмодегіб	Желатинова капсула 150 мг: синя з рожевим 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто желатинових капсул, приймати один раз на день, щодня. Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відкриваючи та не розчиняючи капсули.

У встановлений час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

1 раз на добу, у встановлений час, з їжею чи без їжі									
Без перерви								...	
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7		Д28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції печінки та м'язів), а також моніторинг клінічного стану (тести на вагітність).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ЕРІВЕДЖЕМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ЕРІВЕДЖА® слід уникати вживання звіробію та антиоксидантів.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Найбільш поширені	Проблеми з опорно-руховим апаратом: скорочення м'язів, біль у суглобах та кінцівках Проблеми зі шкірою: випадання волосся, висип, свербіж Порушення травлення: порушення смакового сприйняття, втрата ваги, нудота, діарея, кислотний рефлюкс, закріп Стомленість
Пацієнти, які потребують особливої уваги під час лікування	Жінки дітородного віку (вагітність протипоказана, препарат призводить до аномалій розвитку, ризик вроджених вад плода) Чоловіки (обов'язкове використання презервативів під час статевих актів)
ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Підозра на вагітність: > Жінки, яка отримувала лікування Партнерки чоловіка, який отримував лікування Проблеми зі шкірою > Утворення бородавок > Болюча шкіра або червонуватий горбок на шкірі, що супроводжується кровотечею або незагойний > Зміна розміру або кольору родимки Порушення травлення > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Сильний біль у животі > Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин > Випорожнення рідше 3 разів на тиждень
ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?	
Жінки дітородного віку	Вагітність протипоказана , ризик вроджених вад плода. Під час всього періоду лікування та до 2 років після отримання останньої дози використовуйте при статевих стосунках два методи контролю народжуваності. Проводьте тест на вагітність щомісяця та протягом 2 років після останньої дози.
Чоловіки	Протягом усього періоду лікування та до 2 місяців після отримання останньої дози під час статевих актів використовуйте презерватив.
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу .
Догляд за шкірою	Робіть вибір на користь м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. Для захисту від сонця використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.
Випадання волосся	Використовуйте невелику кількість м'якого шампуню (для немовлят). Робіть вибір на користь м'якої щітки. Уникайте занадто частого миття волосся. Уникайте джерел тепла (фена, нагрітих бігуді, гарячого утюжка), барвників, мелірування та хімічної завивки.
ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?	
Порушення смакового сприйняття	Робіть вибір на користь кількох невеликих прийомів теплої та холодної їжі на день. Уникайте вживання металевих кухонних приладдя.
Втрата ваги	Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркви, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Закріп	Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте більше води.
Кислотний рефлюкс	Уникайте факторів ризику: алкоголь, тютюн, кава, ясна та жирна їжа. Робіть вибір на користь дробового харчування.

