



Что такое ЭРИВЕДЖ®

Название препарата	Описание
Висмодегиб	Желатиновая капсула 150 мг: синяя с розовым 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. желатиновых капсул, принимать один раз в день каждый день. Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

В установленное время, во время еды или вне еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

1 раз в сутки, в установленное время, во время еды или вне еды										
Без перерыва									...	
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7			Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей формулы крови, функции печени и мышц), а также мониторинг клинического состояния (тесты на беременность).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ЭРИВЕДЖЕМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ЭРИВЕДЖА® следует избегать употребления зверобоя и антиоксидантов.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	Проблемы с опорно-двигательным аппаратом: сокращение мышц, боль в суставах и конечностях Проблемы с кожей: выпадение волос, зуд, сыпь Нарушения пищеварения: нарушения вкусового восприятия, потеря веса, тошнота, диарея, кислотный рефлюкс, запор Усталость
Пациенты, требующие особого внимания во время лечения	Женщины детородного возраста (беременность противопоказана, препарат приводит к аномалиям развития, риск врождённых пороков плода) Мужчины (обязательное использование презервативов во время половых актов)
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Подозрение на беременность > женщины, получавшей лечение > партнёрши мужчины, получавшего лечение Проблемы с кожей > Образование бородавок > Болезненная кожа или красноватый бугорок на коже, сопровождающийся кровотечением или незаживающий > Изменение размера или цвета родинки Нарушения пищеварения > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов > Стул реже 3 раз в неделю
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Женщины детородного возраста	Беременность противопоказана , риск врождённых пороков плода. Во время всего периода лечения и до истечения 2 лет после получения последней дозы используйте при половых отношениях два метода контроля рождаемости. Проводите тест на беременность каждый месяц и в течение 2 лет после получения последней дозы.
Мужчины	В течение всего периода лечения и до истечения 2 месяцев после получения последней дозы во время полового акта используйте презерватив.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес .
Уход за кожей	Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.
Выпадение волос	Используйте небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). Делайте выбор в пользу мягкой щётки. Избегайте слишком частого мытья волос. Избегайте источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Нарушения вкусового восприятия	Делайте выбор в пользу нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день. Избегайте употребления металлических кухонных принадлежностей.
Потеря веса	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте побольше воды.
Кислотный рефлюкс	Избегайте факторов риска: алкоголь, табак, кофе, обильная и жирная еда. Делайте выбор в пользу дробного питания.

