



Що таке ІНЛІТА®

Назва препарату	Опис
Акситиніб	Пігулка 1 мг: овальна, червона Пігулка 3 мг: кругла, червона Пігулка 5 мг: трикутна, червона Пігулка 7 мг, ромбоподібна, червона 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.
У Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто пігулок мг та пігулок мг
2 рази на день, щодня.
Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи та не розрізаючи пігулки.
У встановлений час, з їжею чи без їжі.
Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

2 рази на день, у встановлений час, з їжею чи без їжі									
Без перерви	 Д1	 Д2	 Д3	 Д4	 Д5	 Д6	 Д7	...	 Д28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.
Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологоти.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції печінки, нирок та щитовидної залози; аналіз сечі на наявність білка), а також моніторинг клінічного стану (артеріальний тиск, електрокардіограма).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ІНЛІТОЮ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.
Приклад: При прийманні ІНЛІТИ® слід уникати вживання звіробію та грейпфруту.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.



ПОБІЧНІ ЯВИЩА	
Найбільш поширені	Порушення травлення: діарея, зниження апетиту, нудота, втрата ваги, блювота, закріп, запалення у роті (виразки) Судинні розлади: гіпертонія, крововилив, флебіт Проблеми зі шкірою: запалення долонь, підшв ніг та ділянок тертя (долонно-підшовний синдром) Проблеми зі щитовидною залозою: гіпо- чи гіпертиреоз Інші: стомленість, зміна голосу, білок у сечі, кашель, біль в суглобах
ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Симптоми, що свідчать про гіпертонію > Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення > Збільшення показників артеріального тиску Порушення травлення > Суттєва та (або) швидка втрата ваги > Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу > Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі > Сильний біль у животі Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця > Слабкість в одному боці тіла, сильні головні болі, судоми, сплутаність свідомості, труднощі з розмовою, зміни зору або сильні запаморочення > Задихка, прискорене серцебиття, біль або почуття стиснення в грудях > Надмірна втома, здуття живота, набряклість ніг чи щиколоток Симптоми, що свідчать про крововилив чи флебіт > Кров у випорожненні чи у блювотних масах > Червона, тепла та болісна ікра ноги Симптоми, що свідчать про набряк мозку: > Головний біль, сплутаність свідомості, судоми або проблеми зі зором
ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?	
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу.
Крововилив / кровотечі	Уникайте приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...) Повідомте свого лікаря: > якщо ви приймаєте <i>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти</i>: необхідний ретельний моніторинг > про випадки <i>хірургічного чи стоматологічного</i> втручання.
Гігієна порожнини рота	Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Догляд за шкірою	На кистях рук і стопах: Нанесіть зволожуючий крем або молочко, і (або) загоючий крем на кисті рук і стопи (не втираючи сильно). Уникайте піддавати кисті рук і стопи дії високих температур (гарячої води). Уникайте видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. Уникайте носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття. Тіло: Робіть вибір на користь м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. Для захисту від сонця використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?	
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Запалення у роті (виразки)	Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.
Порушення смакового сприйняття	Робіть вибір на користь кількох невеликих прийомів теплої та холодної їжі на день. Уникайте вживання металевих кухонного приладдя.
Втрата ваги	Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».

