



أبيماسيكليب - فيرزينيوس® ABEMACICLIB - VERZENIOS®

ما هو دواء فيرزينيوس

وصف الجزيء	الوصف
أبيماسيكليب	قرص 50 ملغ: بييج، قرص 100 ملغ: أبيض، قرص 150 ملغ: أصفر

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة العلاج من قبل الطبيب.
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي قرص واحد..... ملغ يتم تناوله مرتّان (2) في اليوم، يوميًا.
تُبَلع الأقراص كاملةً مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو تقطيعتها.
تُؤخذ في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة أو خارجها.
في حالة النسيان أو التقوُّي: يمنع أخذ جرعة إضافية، وينبغي انتظار وقت الجرعة التالية.

الجرعة – كيفية تناول الدواء

  	جرعتان في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة أو خارجها
        	باستمرار اليوم 1 - اليوم 28 اليوم 1 اليوم 2 اليوم 3 اليوم 4 اليوم 5 اليوم 6 اليوم 7 اليوم 28

كيفية التحكم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدّم الكامل ووظائف الكبد والكلية).
منع الحمل
قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقعي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى و/أو نظامك الغذائي
قد يكون للتفاعلات بين VERZENIOS® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وقدرة تحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية و/أو المواد الأخرى التي يتم استهلاكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).
مثال: تقاذ تناول نبتة سانت جون والجريب فروت مع VERZENIOS

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية

الأكثر شيوعاً	اضطرابات الجهاز الهضمي: الإسهال، الغثيان، التقيؤ، اضطراب الذوق، فقدان الشهية خلل في الفحص البيولوجي: انخفاض العدلات متعددة النوى (قلة العدلات)، وفي الصفائح الدموية (قلة الصفائح)، انخفاض في الهيموجلوبين (فقر الدم)، خلل في فحص الكبد اضطرابات الجلد: الطفح الجلدي، الجفاف، الحكة، تساقط الشعر اضطرابات الرؤية: التدميع المفرط اضطرابات الأوعية الدموية: التهاب الوريد أخرى: التهاب، تعب، دوخة
متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟	
تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة	أعراض تشير إلى العدوى درجة حرارة تفوق 38.5 درجة مئوية سعال، ألم في الحلق، ألم عند التبول، إسهال مع حمى اضطرابات الجهاز الهضمي في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع إسهال متكرر جداً والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة و/أو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً. أعراض تشير إلى التهاب الوريد احمرار وسخونة وألم على مستوى عضلة الساق اضطرابات على مستوى الرئة ازدياد السعال المستمر أو صعوبة التنفس
كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟	
العدوى	ينبغي تجنب الذهاب إلى الأماكن التي تشكل خطورة عليك (الحشود، والاحتكاك بالمرضى، وما إلى ذلك). قد يوصى بالتطعيم ضد الأنفلونزا والمكورات الرئوية: من أجل الوقاية
الوزن	ينبغي مراقبة وزنك بانتظام في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي
التعب	ينبغي اختيار الأنشطة التي توفر لك الراحة، وعلى وجه الخصوص، النشاط البدني الملائم والمنظم: المشي والبستنة والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها ينبغي الحرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة
الغثيان	ينبغي تجنب القيادة في حالة الإضاءة المنخفضة
تساقط الشعر	ينبغي استخدام كمية صغيرة من شامبو لطيف (للأطفال) ينبغي اختيار فرشاة شعر ناعمة ينبغي تجنب غسل الشعر بشكل متكرر. وتجنب مصادر الحرارة (مجففات الشعر، وأدوات تجعيد الشعر الساخنة، ومكواة الشعر الساخنة)، والصبغات، والتلوين المتدرج للشعر، وتجعيد الشعر
كيفية ضبط نظامك الغذائي؟	
الإسهال	يُنصح بانتقاء نظام غذائي ذو نسبة قليلة من الألياف. ويفضّل تناول النشويات والجزر والموز تجنب تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول اشرب الكثير من الماء
الغثيان	يُنصح بانتقاء نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة يُنصح بالتقليل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة
فقدان الشهية	يُنصح بانتقاء نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية و"نظاماً غذائياً ممتعاً"
اضطراب الذوق	يُنصح باعتماد تناول الطعام الفاتر أو البارد مقسماً إلى عدة وجبات صغيرة في اليوم ينبغي تجنب أدوات المطبخ المعدنية

