



ALECTINIB - أليسينسا®

ما هو دواء أليسينسا

الوصف	وصف الجزيء
كبسولة 150 ملг: بيضاء 	أليكتينيب

كيف يتناول هذا الدواء؟

تحدد جرعة علاجك من قبل طبيبك.
في الثالث، تقرر الجرعة بـ..... ملغ في اليوم، أي..... كبسولة (كبسولات) 150 ملغ يتم تناولها مررتان (2) في اليوم، يومياً.
تلعب الكبسولات كاملة مع كوب من الماء، دون فتحها أو مضغها أو تنويبها.
تؤخذ في وقت محدد، أثناء تناول الوجبات.
في حالة نسيان الجرعة، يمكن تناول الجرعة خلال 6 ساعات. في حالة التأخير: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

الجرعة – طريقة إعطاء الدواء

	جر عتان (2) في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبات.
	بشكل مستمر

كيفية التحكم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفّر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلّب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة ببولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدم الكامل ووظائف الكبد وكيناز الكيراتين الفسفوري) ومراقبة سريرية (قياس ضغط الدم وتخطيط القلب الكهربائي).
التفاعلات مع الأدوية الأخرى وأو نظامك الغذائي
قد يكون للتفاعلات بين ALECENSA® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية وأو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكمّلات الغذائية وما إلى ذلك).
مثلاً: تقدّم تناول عصير الجريب فروت، بنتة سانت جون، أرز الخميراء الحمراء مع ALECENSA®.



ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية

اضطرابات الجهاز الهضمي: الإمساك، الغثيان، الإسهال، آلام البطن، التهاب الفم (التهاب الفم)، اضطرابات النزق، زيادة الوزن
الآلام: العضلات (المُعَضْلِي)
الوذمة: انفاخ الأطراف
خلال الفحص البيولوجي: ارتفاع كيناز الكيراتين الفسفوري، انخفاض في اليموجلوبين (فقر الدم)، خلل في فحص الكبد
اضطرابات الجلد: الحساسية من الشمس، الطفح الجدري
اضطرابات على مستوى العين: عدم وضوح الرؤية، انخفاض الرؤية
اضطرابات على مستوى القلب اضطرابات على مستوى الرئتين

الأكثر شيوعاً

متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟

اضطرابات الجهاز الهضمي

في حالة فقدان الوزن بشكل كبير وأو سريع
 إسهال متكرر جداً والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم
 ألم أو تقرحات في الفم تمنع اتباع نظام غذائي طبيعي
 آلام حادة في المعدة
 عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة وأو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً
 التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع

اضطرابات عضلية

ألم غير عادي وغير مبرر في العضلات
اضطرابات على مستوى الرئة
 ازدياد السعال المستمر أو صعوبة التنفس
أعراض تشير إلى بطء معدل ضربات القلب (بطء القلب)
 فقدان الوعي، والدوخة وانخفاض ضغط الدم
اضطرابات على مستوى العين
 ألم في العين، أو التدمع أو الاحمرار أو عدم وضوح الرؤية أو الحساسية للضوء

تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة

كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟

رقب وزنك بانتظام في حالة وجود اضطرابات في الهضم أو تورم الأطراف (وذمة)

الوزن

استخدم صابوناً لطيفاً للبشرة وعامل ترطيب عند الغسل وتجفيف البشرة بالطبقة
تجنب أي استخدام للمنتجات المهيجة
 للحماية من أشعة الشمس، **استخدم** كريم واقي من أشعة الشمس وتجنب التعرض لها

العناية بالبشرة

استخدم فرشاة أسنان ناعمة **احرص** على غسل الفم ببيكربونات الصوديوم
تجنب غسول الفم الذي يحتوي على المثلول أو الكحول

نظافة الأسنان

تجنب ارتداء العدسات اللاصقة. **تجنب** القيادة في حالة الإضاءة المنخفضة

العينان

تجنب الملابس والجوارب والأحذية الضيقة
 ارفع قدميك. **رقب** وزنك بانتظام

الوذمة

اختر الأنشطة التي توفر لك الراحة، وعلى وجه الخصوص، النشاط البدني الملاzem والمنتظم: المشي والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها
احرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة

التعب



كيفية ضبط نظامك الغذائي؟

الغثيان	انتق نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحرارة
الإمساك	انتق نظاماً غذائياً غنياً بالألياف. اشرب الكثير من الماء
الإسهال	انتق نظاماً غذائياً ذات نسبة قليلة من الألياف. يفضل تناول النشويات والجزر والموز تجنب تناول الفواكه والخضروات النينة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول اشرب الكثير من الماء
اضطراب الدُّوْرَق	اعتمد تناول الطعام الفاتر أو البارد مقسماً إلى عدة وجبات صغيرة في اليوم تجنب أدوات المطبخ المعدنية
التهاب الفم (قرحات الفم)	تفاد تناول الأطعمة الحمضية أو المقرمشة والأطعمة شديدة الملوحة
الوذمة	انتق نظاماً غذائياً ذات نسبة قليلة من الملح

3/3

يتم توفير ONCOLIEN من شركة SFPO بموجب شروط الترخيص Creative Commons Attribution - المشاركة بنفس الشروط 4.0 الدولية.

استناداً إلى العمل الموجود على <https://oncolien.sfpo.com>

يمكن الحصول على آذونات خارج نطاق هذا الترخيص على <https://www.sfpo.com>



المؤسسة الفرنسية لصيدلة الأورام - نموذج مساعد في تقديم العلاج الكيميائي لأخصائي الرعاية الصحية