



ANAGRELIDE - XAGRID®

რა არის XAGRID

მოლეკულის აღწერა	აღწერა
ანაგრელიდი	0,5 მგ-იანი თეთრი კაფსულა არსებობს გენერიკები სხვადასხვა ფორმით

როგორ უნდა მიიღოთ წამალი?

წამლის დოზირება განსაზღვრულია თქვენი ექიმის მიერ.
თქვენს შემთხვევაში, არის მგ/დღეში, ანუ კაფსულა, რომელიც უნდა მიიღოთ დღეში, ყოველდღე.
დოზირება შეიძლება შეიცვალოს მკურნალობის მიმდინარეობისას. იგი დამოკიდებულია თქვენი თრომბოციტების რაოდენობაზე.
ტაბლეტი უნდა გადაყლაპოთ მთლიანი, ერთ ჭიქა წყალთან ერთად, განზავებისა და გახსნის გარეშე.
მიიღეთ ფიქსირებულ დროს, საკვებთან ან მის გარეშე.
დავინყების ან ღებინების შემთხვევაში: არ მიიღოთ დამატებითი დოზა, დაელოდეთ შემდეგ მიღებას.

დოზირება - მიღების წესი

სულ ცოტა 2-ჯერ დღეში, ერთსა და იმავე დროს, საკვებთან ან მის გარეშე	  
უწყვეტლივ	       ...  დ1 დ2 დ3 დ4 დ5 დ6 დ7 ... დ28

როგორ მოიქცეთ, რომ არ გამოგელიოთ მარაგი?

ეს წამალი ხელმისაწვდომია ქალაქის აფთიაქებში.
მის მიწოდებას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო. ყურადღებით იყავით და დაგეგმეთ რეცეპტის განახლება წინასწარ.
გთხოვთ შეინახოთ ეს წამალი ორიგინალ შეფუთვაში, სითბოსა და ტენიანობისგან დაცულ ადგილას.

სხვა რა ინფორმაცია უნდა იცოდეთ?

გამაფრთხილებელი ზომები და მეთვალყურეობა
თქვენი მედიკამენტის მიღება საჭიროებს ბიოლოგიურ მეთვალყურეობას (სისხლის საერთო ანალიზის აღება, რომელიც საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ სისხლის ანალიზის მაჩვენებელს, თირკმლისა და ღვიძლის ფუნქციებს, კალიუმს) და კლინიკურ მეთვალყურეობას (ელექტროკარდიოგრამა).
კონტრაცეფცია
ეს წამალი შეიძლება ზიანს აყენებდეს ჩანასახს. თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მისი შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ ეფექტური კონტრაცეპტული მეთოდები (პრეზერვატივი და დამატებითი მეთოდი).
მედიკამენტებთან და/ან კვებასთან ურთიერთქმედება
XAGRID®-ის სხვა პრეპარატებთან ერთად მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ეფექტები (პრეპარატის ეფექტურობისა და ამტანობის შემცირება). ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ფარმაცეტი და მკურნალი ექიმი ინფორმირებული იყვნენ ყველა იმ მედიკამენტის და/ან სხვა ნივთიერების (საკვები პროდუქტები, მცენარეები, პრობიოტიკები, ეთერზეთები, საკვები დანამატები და სხვ.) შესახებ, რომელსაც იღებთ.
მაგალითი: მოერიდეთ გრეიფრუტის წვენის, კრაზანას, ბოლდოს, ფიკუსის, აზიური შენშენის, და ფასიფლორას მიღებას XAGRID®-თან ერთად.

რომელია არასასურველი გვერდითი მოვლენები?

ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენები ჩამოთვლილია ქვემოთ. ასევე შესაძლოა სხვა გვერდითი ეფექტებიც გამოვლინდეს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით მედიკამენტის ინსტრუქციას ან მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი მოვლენები

1/2



SFPO-ს ონკომული ხელმისაწვდომია Creative Commons Attribution - გაზიარება იგივე პირობებში ლიცენზიის პირობების შესაბამისად 4.0 International .

ემყარება შემდეგ ნაშრომს <https://oncolien.sfpo.com>.

ამ ლიცენზიის გარეშე ავტორიზაციის მოპოვება ხდება შემდეგ ბმულზე <https://www.sfpo.com>

საფრანგეთის ონკოლოგიური ფარმაციის საზოგადოება – ქიმიოთერაპიის გაცემის დახმარების ფურცელი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის

ყველაზე ხშირი	თავის ტკივილები გულის ფუნქციების დარღვევები: ძლიერი, სწრაფი ან არარეგულარული გულისცემა (გულის ფრიალი) ზოგადი დარღვევები: წყლის შეკავება მომწელებელი სისტემის დარღვევები: გულის რევის შეგრძნება სხვა: კანის გამონაყარი, დაღლილობა, ანემია
როდის უნდა მიმართოთ სამედიცინო გუნდს?	
გააფრთხილეთ სამედიცინო გუნდი შემდეგ შემთხვევებში, თუ არ გაქვთ მიღებული კონკრეტული სამედიცინო რეკომენდაციები	მომწელებელი სისტემის დარღვევები თუ დიდი რაოდენობით და/ან სწრაფად დაკარგეთ წონა ძალიან ხშირი დიარეა გაქვთ და 4-ზე მეტზე გადიხართ კუჭში ინტენსიური ტკივილი მუცლის არეში გულის პრობლემის მაჩვენებელი სიმპტომები სუნთქვის უკმარისობა, გულის ფრიალი, წნეხი გულმკერდის არეში ფეხების შეშუპება (შებერილობა) მოლურჯო კანი ან ტუჩები ჰემორაგიის მაჩვენებელი სიმპტომები სისხლი განავალში ან ლებინების შემთხვევაში სისხლდენა (ჩალურჯებები), ცხვირიდან სისხლდენა
როგორ უნდა მოახდინოთ გვერდითი მოვლენების პრევენცია?	
სისხლდენა	მოერიდეთ ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღებას (იბუპროფენი, ასპირინი და ა.შ.) გააფრთხილეთ თქვენი ექიმი: თუ მოიხმართ ანტიკოაგულანტებს და თრომბოციტურ ანტიაგრეგანტებს: აუცილებელია განსაკუთრებული მეთვალყურეობა ქირურგიული ან სტომატოლოგიური ჩარევისას
თავის ტკივილები	შეზღუდეთ თვითმკურნალობა თქვენი მკურნალობის პარალელურად
შეშუპება (ფეხების შებერილობა)	ნუ ატარებთ ძალიან მჭიდრო ტანსაცმელს, წინდებსა და ფეხსაცმელებს. ააწყვეთ ფეხები სიმაღლეზე. რეგულარულად გაიკონტროლეთ წონა.
წონა	გააკონტროლეთ რეგულარულად თქვენი წონა კუჭ-ნაწლავის დარღვევების ან შეშუპების დროს
დაღლილობა	ამჯობინეთ ისეთი აქტივობები, რომლებიც თქვენს კარგად ყოფნას უწყობს ხელს, განსაკუთრებით კი ადაპტირებული და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა: სიარული, მებაღეობა, ცურვა, ველოსიპედით გადაადგილება, სპორტი და ა.შ. ჩაანაცვლეთ აქტივობის პერიოდი დასვენებით და პირიქით.
კანის მოვლა	უპირატესობა მიანიჭეთ რბილ საპონს და დამატენიანებელ კრემს, გაიშრეთ ტამპონირებით. მოერიდეთ ნებისმიერი გამაღიზიანებელი საშუალების გამოყენებას. მზისგან დასაცავად გამოიყენეთ დამცავი კრემი და მოერიდეთ მზეზე გასვლას.
როგორ უნდა დაიწყოთ ადაპტირებული კვება?	
დიარეა	უპირატესობა მიანიჭეთ დაბალი რაოდენობის ბოჭკოვან საკვებს. სასურველია მიირთვათ სახამებლის შემცველი საკვები, სტაფილო, ბანანი. არ მიირთვათ უმი ხილი და ბოსტნეული, რძის პროდუქტები, ყავა და ალკოჰოლი. დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით.
გულისრევის შეგრძნება	უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაგმენტულ კვებას, რომელიც გადანაწილებულია რამდენიმე მსუბუქ რაციონად. საკვები უნდა იყოს თხევადი და ცივი. შეზღუდეთ ცხიმოვანი, შემწვარი და ცხარე საკვები.
შეშუპებები	უპირატესობა მიანიჭეთ საკვებს მარილის დაბალი რაოდენობით