



AXITINIB - INLYTA®

რა არის INLYTA

მოლეკულის აღწერა	აღწერა
აქსიტინიბი	1 მგ ოვალური წითელი ტაბლეტი 3 მგ მრგვალი წითელი ტაბლეტი 5 მგ სამკუთხა წითელი ტაბლეტი 7 მგ, რომბის ფორმის, წითელი ტაბლეტი 

როგორ უნდა მიიღოთ წამალი?

წამლის დოზირება განსაზღვრულია თქვენი ექიმის მიერ.

თქვენს შემთხვევაში, არის მგ/დღეში, ანუ მგ-იანი ტაბლეტი და მგ-იანი ტაბლეტი, რომელიც უნდა მიიღოთ 2-ჯერ დღეში, ყოველდღე. ტაბლეტი უნდა გადაყლაპოთ მთლიანი, ერთ ჭიქა წყალთან ერთად, დაქუცმაცების ან გატეხვის გარეშე. მიიღეთ ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეთ. დავიწყების ან ლებინების შემთხვევაში: არ მიიღოთ დამატებითი დოზა, დაელოდეთ შემდეგ მიღებას.

დოზირება - მიღების წესი

2-ჯერ დღეში, ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეთ	  
უწყვეტლივ	 დ1  დ2  დ3  დ4  დ5  დ6  დ7 ...  დ28

როგორ მოიქცეთ, რომ არ გამოგელიოთ მარაგი?

ეს წამალი ხელმისაწვდომია ქალაქის აფთიაქებში.

მის მიწოდება შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო. ყურადღებით იყავით და წინასწარ დაგეგმეთ თქვენი რეცეპტის განახლება.

შეინახეთ ეს წამალი ორიგინალ შეფუთვაში, სითბოსა და ტენიანობისგან დაცულ ადგილას.

სხვა რა ინფორმაცია უნდა იცოდეთ?

გამარფრთხილებელი ზომები და მეთვალყურეობა

თქვენი მედიკამენტის მიღება საჭიროებს ბიოლოგიურ მეთვალყურეობას (სისხლის ანალიზის აღება, რომელიც საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ სისხლის ანალიზის მაჩვენებლებს, ღვიძლის, თირკმლის და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციებს, შარდის შეგროვება ცილის დონის მონიტორინგისთვის) და კლინიკურ მეთვალყურეობას (არტერიული წნევა, ელექტროკარდიოგრამა).

კონტრაცეფცია

ეს წამალი შეიძლება ზიანს აყენებდეს ჩანასახს. თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მისი შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ ეფექტური კონტრაცეპტული მეთოდები (პრეზერვატივი და დამატებითი მეთოდი).

მედიკამენტებთან და/ან კვებასთან ურთიერთქმედება

INLYTA®-ის სხვა პრეპარატებთან ერთად მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ეფექტები (პრეპარატის ეფექტურობისა და ამტანობის შემცირება). ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ფარმაცევტი და მკურნალი ექიმი ინფორმირებული იყვნენ ყველა იმ მედიკამენტის და/ან სხვა ნივთიერებების (საკვები

პროდუქტები, მცენარეები, პრობიოტიკები, ეთერზეთები, საკვები დანამატები და სხვ.) შესახებ, რომელსაც იღებთ.
მაგალითი: მოერიდეთ კრაზანას ან გრეიფრუტის წვენის მიღებას INLYTA®-თან ერთად.

რომელია არასასურველი გვერდითი მოვლენები?

ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენები ჩამოთვლილია ქვემოთ. ასევე შესაძლოა სხვა გვერდითი ეფექტებიც გამოვლინდეს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით მედიკამენტის ინსტრუქციას ან მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი მოვლენები	
ყველაზე ხშირი	საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევები: დიარეა, მადის დაქვეითება, გულისრევა, წონის დაკლება, ღებინება, კუჭის შეკრულობა, პირის ღრუს ანთება (პირის ღრუს წყლულები). სისხლძარღვოვანი დარღვევები: მაღალი არტერიული წნევა, სისხლდენა, ფლებიტი. კანის დაავადებები: ხელისგულების, ფეხის ტერფების და ხახუნის უბნების ანთება (ხელ-ტერფის სინდრომი) ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები: ჰიპო ან ჰიპერთირეოზი სხვა: დაღლილობა, ხმის ცვლილებები, ცილები შარდში, ხველა, სახსრების ტკივილი.
როდის უნდა მიმართოთ სამედიცინო გუნდს?	
გააფრთხილეთ სამედიცინო გუნდი შემდეგ შემთხვევებში, თუ არ გაქვთ მიღებული კონკრეტული სამედიცინო რეკომენდაციები	ინფექციის მაჩვენებელი სიმპტომები თავის ტკივილი, ყურებში ზუზუნის და/ან თავბრუსხვევა ციფრების ზრდა არტერიული წნევის გაზომვისას მომნელებელი სისტემის დარღვევები მნიშვნელოვანი და/ან სწრაფი წონის დაკლების შემთხვევაში ძალიან ხშირი დიარეა, დღეში 4-ზე მეტი კუჭში გასვლა ტკივილები პირის ღრუს არეში ან წყლულები, რომლებიც ხელს გიძლით ნორმალურ კვებაში ინტენსიური ტკივილი მუცლის არეში გულის პრობლემის მაჩვენებელი სიმპტომები სისუსტე სხეულის ერთ მხარეს, ძლიერი თავის ტკივილი, კრუნჩხვები, დაბნეულობა, მეტყველების გაძნელება, მხედველობის ცვლილებები ან ძლიერი თავბრუსხვევა. სუნთქვის უკმარისობა, გულის ფრიალი, წნეხი გულმკერდის არეში. ჭარბი დაღლილობა, მუცლის, ფეხების ან კოჭების მეტერილობა. სისხლდენის ან ფლებიტის მიმანიშნებელი სიმპტომები სისხლი განავალში ან ღებინების დროს. შენითლება წვივის არეში, ტკივილი და შეხურება გულის პრობლემის მაჩვენებელი სიმპტომები თავის ტკივილები, დაბნეულობა, კრუნჩხვები. მხედველობის დარღვევები
როგორ უნდა მოახდინოთ გვერდითი მოვლენების პრევენცია?	
წნევის კონტროლი	მაღალი წნევა უნდა გამოსწორდეს. არტერიული წნევის გაზომვა რეკომენდირებულია რეგულარულად. ფარმაცევტებს შეუძლიათ დაგეხმარონ წნევის გაზომვაში. შეგიძლიათ სთხოვოთ, რომ თქვენ თვითონ გაიზომოთ ავტო-წნევის გაზომვით.
წონა	გააკონტროლეთ თქვენი წონა კუჭ-ნაწლავის დარღვევების დროს
სისხლდენა, სისხლჩაქცევები	მოერიდეთ ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღებას (იბუპროფენი, ასპირინი და ა.შ.) აცნობეთ თქვენს ექიმს: თუ იღებთ ანტიკოაგულანტებს ან თრომბოციტების ანტიაგრეგანტულ პრეპარატებს: საჭიროა მკაცრი მონიტორინგი ქირურგიული ან სტომატოლოგიური ჩარევის შემთხვევაში

სტომატოლოგიური ჰიგიენა	გამოიყენეთ რბილი კბილის ჯაგრისი და გამოიყენეთ პირის ღრუს სავლები ნატრიუმის ბიკარბონატით. მოერიდეთ მენტოლის ან ალკოჰოლის შემცველ პირის ღრუს სავლებს
კანის მოვლა	ხელებსა და ფეხებზე: წაისვით ხელებსა და ფეხებზე დამატენიანებელი კრემი ან რძე და/ან შემახორცებელი კრემი (ძლიერი შეშელვის გარეშე). მოერიდეთ ხელებისა და ფეხების სიცხესთან (ცხელ წყალთან) შეხებას. მოერიდეთ აქტივობებს, რომლის დროსაც ხდება ხახუნი ან წარმოიქმნება წრილობები. მოერიდეთ მჭიდრო ტანსაცმელს, წინდებსა და ფეხსაცმელს. სხეული: ჰიგიენისთვის უპირატესობა მიანიჭეთ რბილ საპონს და დამატენიანებელ კრემს, გაიშრეთ ტამპონირებით. მოერიდეთ ნებისმიერი გამაღიზიანებელი საშუალების გამოყენებას. მზისგან დასაცავად გამოიყენეთ მზის დამცავი კრემი და მოერიდეთ მზეზე გასვლას.
დაღლილობა	ამჯობინეთ ისეთი აქტივობები, რომლებიც თქვენს კარგად ყოფნას უწყობს ხელს, განსაკუთრებით კი ადაპტირებული და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა : სიარული, მებაღეობა, ცურვა, ველოსიპედით სიარული, სპორტი და ა.შ. ჩაანაცვლეთ აქტივობის პერიოდი დასვენებით და პირიქით.
როგორ უნდა დაიწყოთ ადაპტირებული კვება?	
დიარეა	უპირატესობა მიანიჭეთ დაბალ ბოჭკოვან დიეტას. სასურველია, მიირთვათ სახამებლიანი პროდუქტები, სტაფილო და ბანანი. მოერიდეთ უმ ხილს და ბოსტნეულს, რძის პროდუქტებს, ყავას და ალკოჰოლს. დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით.
გულის რევის შეგრძნება	უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაგმენტულ კვებას, რომელიც გადანაწილებულია რამდენიმე მსუბუქ რაციონად. საკვები უნდა იყოს თხევადი და ცივი. შეზღუდეთ ცხიმოვანი, შემწვარი და ცხარე საკვები.
პირის ღრუს ანთება (წყლულები)	მოერიდეთ მჟავა ან წებოვანი საკვების მიღებას და ძალიან მარილიან საკვებს.
გემოს შეგრძნების დარღვევები	მიიღეთ თბილი ან ცივი საკვები პატარა რაციონით რამდენჯერმე დღეში. მოერიდეთ სამზარეულოს მეტალის ქურჭელს.
წონის დაკარგვა	უპირატესობა მიანიჭეთ უფრო კალორიულ საკვებს და „გემრიელ კვებას“.