



بيكالوتاميد - كاسوديكس® BICALUTAMIDE - CASODEX®

ما هو دواء كاسوديكس

الوصف	وصف الجزيء
<p>قرص 50 ملغ: أبيض ودائري توجد أشكال مختلفة من الأدوية الجينية</p> 	بيكالوتاميد

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك.
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي..... قرص (أقرص)، يتم تناوله جرعة واحدة يوميًا.
تُبَلع الأقرص كاملة مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو مضغها أو تخفيفها.
في وقت محدد. أثناء تناول الوجبة أو خارجها.
في حالة نسيان الجرعة، يمكن تناول الجرعة خلال 12 ساعة. أما في حالة التقيؤ: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

الجرعة - طريقة إعطاء الدواء

  	جرعة واحدة في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة أو خارجها
       	بشكل مستمر

كيفية التحكّم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة وظائف الكبد والبوتاسيوم) ومراقبة سريرية (تخطيط القلب الكهربائي).
منع الحمل
قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى و/أو نظامك الغذائي
قد يكون للتفاعلات بين CASODEX® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية و/أو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).
مثال: تفاد تناول نبتة سانت جون والبولدو والفوقس الحويصلي والجينسنغ الآسيوي وبرتقال إشبيلية وزهرة العاطفة والهندباء مع CASODEX®

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية	
اضطرابات الجهاز الهضمي: فقدان الشهية، آلام البطن، الإمساك، الغثيان، التقيؤ هبات ساخنة حساسية الثدي وتورمها انخفاض الرغبة الجنسية خلل في الفحص: فقر الدم (انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم)، وجود دم في البول تعب وذمة (انتفاخ الساقين)، زيادة الوزن اضطرابات عصبية: الدوخة، الخمول، الاكتئاب طفح جلدي	الأكثر شيوعاً
متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟	
أعراض اضطرابات على مستوى الرئة ازدياد السعال المستمر أو صعوبة التنفس آلام حادة في المعدة وجود دم في البول أعراض الحساسية حكة مع طفح جلدي تورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحلق، مما يسبب صعوبة في البلع أو التنفس أعراض اضطراب وظائف الكبد يرقان أعراض تشير إلى وجود اضطراب في القلب ضيق في التنفس أو خفقان القلب أو ألم أو ضيق في الصدر اضطرابات الرغبة الجنسية أعراض الاكتئاب	تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة
كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟	
مارس نشاطاً بدنياً ملائماً تجنب مصادر الحرارة	هبات ساخنة
استخدم صابوناً لطيفاً للبشرة وعامل ترطيب عند الغسل وتجنب البشرة بالطبوبة تجنب أي استخدام للمنتجات المهيجة للحماية من أشعة الشمس، استخدم كريم واقى من أشعة الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس	العناية بالبشرة
اختر الأنشطة التي توفر لك الراحة، وعلى وجه الخصوص، النشاط البدني الملائم والمنتظم: المشي والبيسنتة والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها احرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة	تعب
تجنب ارتداء الملابس والجوارب والأحذية الضيقة ارفع قدميك. راقب وزنك بانتظام في حالة وجود الوذمة	الوذمة (انتفاخ الساقين)
كيفية ضبط نظامك الغذائي؟	
تفاد تناول الأطعمة المتبلّة مع الكحول أو الكافيين اشرب الكثير من المشروبات الباردة	هبات ساخنة
اتّبق نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة	الغثيان
اتّبق نظاماً غذائياً ذا نسبة قليلة من الملح	الوذمة

