



SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE
ONCOLIEN®

პაციენტის საინფორმაციო ფურცელი



BICALUTAMIDE - CASODEX®

რა არის CASODEX-ი

მოლეკულის აღწერა	აღწერა
ბიკალუტამიდი	50 მგ ტაბლეტი, მრგვალი, თეთრი არსებობს სხვადასხვა ფორმის ჯენერიკები 

როგორ უნდა მიიღოთ წამალი?

წამლის დოზირება განსაზღვრულია თქვენი ექიმის მიერ.

თქვენს შემთხვევაში, არის მგ/დღეში, ანუ ტაბლეტი, რომელიც უნდა მიიღოთ დღეში ერთხელ, ერთ მიღებაზე, ყოველდღე.

ტაბლეტები გადაყლაპეთ მთლიანად, ერთ ჭიქა წყალთან ერთად, დაქუცმაცების, გატეხვის, დაღეჭვის ან განზავების გარეშე.

მიიღეთ ფიქსირებულ დროს. კვებისას ან კვების გარეშე.

მიღების გამოტოვების შემთხვევაში, მიღება შესაძლებელია 12 საათის განმავლობაში. სამაგიეროდ, ღებინების შემთხვევაში, არ მიიღოთ დამატებითი დოზა და დაელოდეთ შემდეგ მიღებას.

დოზირება - მიღების წესი

ერთი მიღება დღეში, ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეთ	  									
უწყვეტლივ	 დ1	 დ2	 დ3	 დ4	 დ5	 დ6	 დ7	...	 დ28	

როგორ მოიქცეთ, რომ არ გამოგელიოთ მარაგი?

ეს წამალი ხელმისაწვდომია ქალაქის აფთიაქებში.

მის მიწოდებას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო. ყურადღებით იყავით და წინასწარ დაგეგმეთ თქვენი რეცეპტის განახლება.

შეინახეთ ეს წამალი ორიგინალ შეფუთვაში, სითბოსა და ტენიანობისგან დაცულ ადგილას.

სხვა რა ინფორმაცია უნდა იცოდეთ?

გამაფრთხილებელი ზომები და მეთვალყურეობა

თქვენი მედიკამენტის მიღება საჭიროებს ბიოლოგიურ მეთვალყურეობას (სისხლის ანალიზის აღება, რომელიც საშუალებას იძლევა დაავადებით ღვიძლისა ფუნქციების მარცხნებებს და კალიუმის დონეს) და კლინიკურ მეთვალყურეობას (ელექტროკარდიოგრამა).

კონტრაცეფცია

ეს წამალი შეიძლება ზიანს აყენებდეს ჩანასახს. თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მისი შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ ეფექტური კონტრაცეპტული მეთოდები (პრეზერვატივი და სხვა მეთოდი).

მედიკამენტებთან და/ან კვებასთან ურთიერთქმედება

CASODEX®-ის სხვა პრეპარატებთან ერთად მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ეფექტები (პრეპარატის ეფექტურობისა და ამტანობის შემცირება). ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ფარმაცევტი და მკურნალი ექიმი ინფორმირებული იყვნენ ყველა იმ მედიკამენტის და/ან სხვა ნივთიერებების (საკვები პროდუქტები, მცენარეები, პრობიოტიკები, ეთერზეთები, საკვები დანამატები და სხვ.) შესახებ, რომელსაც იღებთ მაგალითი: მოერიდეთ კრაზანას, ბოლდოს, ფიკსის, აზიური ჟენშენის, სევილიური ფორთოხლის, პასიფლორას, ბაბუნავერას მოხმარებას CASODEX®-თან ერთად.



რომელია არასასურველი გვერდითი მოვლენები?

ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენები ჩამოთვლილია ქვემოთ. ასევე შესაძლოა სხვა გვერდითი ეფექტებიც გამოვლინდეს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით მედიკამენტის ინსტრუქციას ან მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი მოვლენები	
ყველაზე ხშირი	საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევები: მადის დაკარგვა, მუცლის ტკივილი, კუჭის შეკრულობა, გულისრევა, ღებინება მოულოდნელი შეხურება მკერდის მგრძნობელობა და შეშუპება ლიბიდოს შემცირება ანალიზის დარღვევები: ანემია (სისხლში ჰემოგლობინის შემცირება), სისხლი შარდში დაღლილობა შეშუპება (ფეხების შებერილობა), წონის მატება ნევროლოგიური დარღვევები: თავბრუსხვევა, ძილიანობა, დეპრესია გამონაყარი
როდის უნდა მიმართოთ სამედიცინო გუნდს?	
გააფრთხილეთ სამედიცინო გუნდი შემდეგ შემთხვევებში, თუ არ გაქვთ მიღებული კონკრეტული სამედიცინო რეკომენდაციები	ფილტვების დაავადების სიმპტომები გაძლიერებული მუდმივი ხველა ან სუნთქვის გაძნელება კუჭის ძლიერი ტკივილი სისხლი შარდში ალერგიის სიმპტომები ქავილი გამონაყართან ერთად სახის, ტუჩების, ენის და/ან ყელის შეშუპება, რაც იწვევს ყლაპვის ან სუნთქვის გაძნელებას ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის სიმპტომები სიყვითლე გულის დარღვევის მიმანიშნებელი სიმპტომები სუნთქვის უკმარისობა, გულის ფრიალი, ტკივილი ან დაჭიმულობა გულმკერდის არეში ლიბიდოს დარღვევები დეპრესიის სიმპტომები
როგორ უნდა მოახდინოთ გვერდითი მოვლენების პრევენცია?	
მოულოდნელი შეხურება	განახორციელეთ ადაპტირებული ფიზიკური აქტივობა. მოერიდეთ სითბოს წყაროებს.
კანის მოვლა	ჰიგიენისთვის უპირატესობა მიანიჭეთ რბილ საპონს და დამატენიანებელ კრემს, გაიშრეთ ტამპონირებით. მოერიდეთ ნებისმიერი გამაღიზიანებელი საშუალების გამოყენებას. მზისგან თავის დასაცავად გამოიყენეთ მზისგან დამცავი კრემი და მოერიდეთ მზის სხივების ზემოქმედებას.
დაღლილობა	ამჯობინეთ ისეთი აქტივობები, რომლებიც თქვენს კარგად ყოფნას უწყობს ხელს, განსაკუთრებით კი ადაპტირებული და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა: სიარული, მებაღეობა, ცურვა, ველოსიპედით სიარული, სპორტი და ა.შ. ჩაანაცვლეთ აქტივობის პერიოდი დასვენებით და პირიქით.
შეშუპება (ფეხების შებერილობა)	მოერიდეთ მჭიდრო ტანსაცმელს, წინდებსა და ფეხსაცმელს. ააწყვეთ ფეხები სიმაღლეზე. გააკონტროლეთ თქვენი წონა შეშუპების შემთხვევაში.
როგორ უნდა დაიწყოთ ადაპტირებული კვება?	
მოულოდნელი შეხურება	მოერიდეთ ცხარე საკვების, ალკოჰოლის ან კოფეინის შემცველი საკვების მიღებას. დალიეთ ცივი სასმელები და დიდი რაოდენობით.
გულის რევის შეგრძნება	უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაგმენტულ კვებას, რომელიც გადანაწილებულია რამდენიმე მსუბუქ რაციონად. საკვები უნდა იყოს თხევადი და ცივი. შეზღუდეთ ცხიმოვანი, შემწვარი და ცხარე საკვები.
შეშუპებები	უპირატესობა მიანიჭეთ მარილის დაბალი შემცველობის დიეტას.

