




بوسوتينيب - بوسوليف® BOSUTINIB - BOSULIF

ما هو دواء بوسوليف

وصف	وصف الجزيء
<p>قرص 100 ملغ: بيضاوي وأصفر قرص 500 ملغ: بيضاوي وأحمر</p>  <p>Orange tablets are 400 mg Red tablets are 500 mg Yellow tablets are 100 mg</p>	بوسوتينيب

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك.
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي..... قرص 100 ملغ و..... قرص 500 ملغ يتم تناولها مرّة واحدة في اليوم، يومياً.
تُبلع الأقراص كاملة مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو مضغها أو تخفيفها.
تؤخذ في وقت محدد. أثناء تناول الوجبة.
في حالة نسيان الجرعة، يمكن تناول الجرعة خلال 12 ساعة. في حالة التقيؤ: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

الجرعة - طريقة إعطاء الدواء

  	جرعة واحدة في اليوم، أثناء تناول الوجبات
       	بشكل مستمر
اليوم 1 2 3 5 6 7 28	4

كيفية التحكّم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدم ووظائف الكبد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والدهون الثلاثية) ومراقبة سريرية (تخطيط القلب الكهربائي).
منع الحمل
قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقى ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى وأو نظامك الغذائي
قد يكون للتفاعلات بين BOSULIF® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية وأو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).
مثال: نقاد تناول نبتة سانت جون والجريب فروت والبولدو والقوقس الحويصلي والجينسنغ الآسيوي وزهرة العاطفة مع BOSULIF®



ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية	
اضطرابات الجهاز الهضمي: الإسهال، الغثيان، آلام البطن، التقيؤ اضطرابات تعداد الدم الكامل: انخفاض في الصفائح الدموية (قلة الصفائح)، أو الهيموجلوبين (فقر الدم) و/ أو في العدلات متعددة النوى (قلة العدلات) اضطرابات الجلد: الطفح الجلدي، الحكة احتباس الماء: تورم الأطراف و/أو الوجه أخرى: حمى، صداع، اضطراب في وظائف الكبد	الأكثر شيوعاً
المرضى الذين يحملون فيروس التهاب الكبد B بشكل مزمن (خطر إعادة تنشيط المرض)	تحتاج بعض الآثار إلى عناية خاصة
متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟	
أعراض تشير إلى العدوى درجة حرارة تفوق 38.5 درجة مئوية سعال، ألم في الحلق، ألم عند التبول، إسهال مع حمى أعراض تشير إلى ارتفاع ضغط الدم الصداع، وطنين في الأذنين و/أو الدوخة ارتفاع الأعداد عند قياس ضغط الدم أعراض تشير إلى وجود اضطراب في القلب أو إلى احتباس الماء فقدان الوعي، وخفقان القلب تورم الكاحلين والقدمين أو الساقين، وصعوبة في التنفس زيادة الوزن السريعة التي ليس لها تفسير اضطرابات الجهاز الهضمي في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع إسهال متكرر جداً، والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم آلام حادة في المعدة أعراض تشير إلى متلازمة انحلال الورم تلون البول انخفاض كمية التبول ألم في جانب واحد تحت الأضلاع	تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة
كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟	
تجنب الذهاب إلى الأماكن التي تشكل خطورة عليك (الحشود، والاحتكاك بالمرضى، وما إلى ذلك) قد يوصى بالتطعيم ضد الأنفلونزا والمكورات الرئوية: من أجل الوقاية	العدوى
من الضروري ضبط ضغط الدم العالي. يوصى بقياس ضغط الدم بانتظام. يمكن للصيادلة مساعدتك في قياس ضغط دمك. يمكنك أيضاً أن تطلب القيام بذلك بنفسك باستخدام جهاز قياس ضغط الدم الذاتي	مراقبة ضغط الدم
راقب وزنك بانتظام في حالة وجود اضطرابات في الهضم أو احتباس الماء	الوزن
استخدم صابوناً لطيفاً للبشرة وعامل ترطيب عند الغسل وتجفيف البشرة بالطبقة تجنب أي استخدام للمنتجات المهيجة للحماية من أشعة الشمس، استخدم كريم واقٍ من أشعة الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس	العناية بالبشرة



<p>التعب</p> <p>اختر الأنشطة التي توفر لك الراحة، وعلى وجه الخصوص، النشاط البدني الملائم والمنتظم: المشي والبستنة والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها أحرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة</p>	
<p>احتباس الماء (انتفاخ الأطراف)</p> <p>تجنب الملابس والجوارب والأحذية الضيقة ارفع قدميك. راقب وزنك بانتظام</p>	
<p>كيفية ضبط نظامك الغذائي؟</p>	
<p>الإسهال</p> <p>انتق نظامًا غذائيًا ذا نسبة قليلة من الألياف. يفضل تناول الشوكلات والجزر والموز تجنب تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول اشرب الكثير من الماء</p>	
<p>الغثيان</p> <p>انتق نظامًا غذائيًا مقسمًا إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة</p>	
<p>احتباس الماء</p> <p>انتق نظامًا غذائيًا ذا نسبة قليلة من الملح</p>	