



## داساتينيب - سبريسل® - SPRYCEL® - DASATINIB

ما هو دواء سبريسل

الوصف	وصف الجزيء
<p>قرص 20 ملغ: أبيض ودائري قرص 50 ملغ: أبيض وبيضاوي قرص 70 ملغ: أبيض ودائري قرص 80 ملغ: أبيض وبيضاوي قرص 100 ملغ: أبيض وبيضاوي قرص 140 ملغ: أبيض ودائري محلول عن طريق الفم 10 ملغ/ملل</p>	<p>داساتينيب</p>



### كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك.  
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي ..... قرص (أقرص) 20 ملغ، أو ..... قرص (أقرص) 50 ملغ، أو ..... قرص (أقرص) 70 ملغ أو ..... قرص (أقرص) 100 ملغ أو ..... قرص (أقرص) 140 ملغ، يتم تناوله جرعة واحدة يوميًا.  
تُبلع الأقرص كاملة مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو مضغها أو تخفيفها.  
تؤخذ في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة أو خارجها.  
في حالة النسيان أو التقيؤ: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر موعد الجرعة التالية.

### الجرعة - طريقة تناول الدواء

  	<p>جرعة واحدة في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة أو خارجها</p>
       	<p>بشكل مستمر</p>

اليوم 1 2 اليوم 3 اليوم 4 اليوم 5 اليوم 6 اليوم 7 اليوم 28

### كيفية التحكم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.  
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.  
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

### ما هي المعلومات الأخرى التي تحتاج إلى معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة

يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدم الكامل ومستوى الكهارل ووظائف الكبد والكلية) ومراقبة سريرية (قياس ضغط الدم).

منع الحمل

قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.



العدوى	<b>تجنّب الذهاب إلى الأماكن التي تُشكّل خطورة عليك (الحشود والاحتكاك بالمرضى، وما إلى ذلك)</b> <b>قد يُوصى بالتطعيم ضد الأنفلونزا والمكّورات الرئويّة: من أجل الوقاية</b>
مراقبة ضغط الدم	من الضروري ضبط ضغط الدم العالي. <b>يُوصى بقياس ضغط الدم بانتظام.</b> يمكن للصّيدالدة مساعدتك في قياس ضغط دمك. يمكنك أيضًا أن تطلّب القيام بذلك بنفسك باستخدام جهاز قياس ضغط الدم الذاتي
تساقط الشعر	<b>استخدم كمية قليلة من شامبو لطيف (للأطفال الرضع) اختر فرشاة شعر ناعمة</b> <b>تجنّب غسل شعرك بشكل متكرر. تجنّب مصادر الحرارة (مجففات الشعر، وأدوات تجعيد الشعر الساخنة، ومكواة الشعر الساخنة)، والمصبغات، والتلوين المتدرج للشعر، وتجعيد الشعر</b>
النزيف	<b>تجنّب تناول مضادات الالتهاب (الإيبوبروفين والأسبرين وغيرها)</b> <b>أخبر طبيبك:</b> ◀ إذا كنت تستهلك <b>مُضادّات التّخثّر أو مضادّات لتجمع الصفائح الدموية</b> فإنّ المراقبة الدقيقة ضرورية ◀ في حالة <b>مداخلة جراحية أو جراحة الأسنان</b>
تعب، آلام	<b>اختر الأنشطة التي تمنحك شعورًا بالراحة، وعلى وجه الخصوص، النشاط البدني الملائم والمنتظم:</b> المشي والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها <b>أحرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة</b>
<b>كيفية ضبط نظامك الغذائي؟</b>	
الإسهال	<b>انتقِ نظامًا غذائيًا ذا نسبة قليلة من الألياف.</b> <b>يفضّل تناول</b> النشويات والجزر والموز <b>تجنّب تناول</b> الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول <b>اشرب الكثير من الماء</b>
الغثيان	<b>انتقِ نظامًا غذائيًا مقسمًا إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة باردة</b> <b>قلّل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة</b>
احتباس الماء	<b>انتقِ نظامًا غذائيًا ذا نسبة قليلة من الملح</b>