



إيناسيدينيب - إدهيفا ENASIDENIB - IDHIFA®

ما هو دواء إدهيفا

وصف الجزيء	الوصف
إيناسيدينيب	قرص 100 ملغ و 50 ملغ

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدد جرعة علاجك من قبل طبيبك.

في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي قرص (أقراص) ملغ في اليوم يتم تناولها مرة واحدة في اليوم، يوميًا. تُبلع الأقراص كاملة مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو مضغها أو تخفيفها. في وقت محدد. أثناء تناول الوجبة أو خارجها. في حالة نسيان الجرعة، يمكن تناول الجرعة خلال 12 ساعة. إذا تقيأت مباشرة بعد تناول الدواء: تناول جرعة جديدة.

الجرعة - كيفية تناول الدواء

جرعة واحدة في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة أو خارجها	  
بشكل مستمر	        اليوم 1 اليوم 2 اليوم 3 اليوم 4 اليوم 5 اليوم 6 اليوم 7 اليوم 28

كيفية التحكم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.

وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً. يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة

يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدم الكامل ووظائف الكبد والكلية ومستويات البوتاسيوم وحمض اليوريك والفوسفور والكالسيوم) ومراقبة سريرية.

منع الحمل

قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى و/أو نظامك الغذائي

قد يكون للتفاعلات بين IDHIFA® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية و/أو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).

مثال: تفاد تناول عصير الجريب فروت، نبتة سانت جون، أرز الخميرة الحمراء مع IDHIFA®



ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية	
اضطرابات الجهاز الهضمي: الإسهال، الغثيان، التقيؤ، فقدان الشهية، اضطراب الذوق أو فقدانه خلل في الفحص البيولوجي: زيادة خلايا الدم البيضاء (كثرة الكريات البيض)، البيليروبين (فرط بيليروبين الدم)، انخفاض مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفات (نقص كالسيوم الدم، نقص بوتاسيوم الدم، نقص فوسفات الدم) متلازمة انحلال الورم: ارتفاع في نسبة البوتاسيوم، الفوسفور، واليوريا (فرط بوتاسيوم الدم، فرط فوسفور الدم، فرط حمض اليوريك في الدم). انخفاض نسبة الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم)	الأكثر شيوعاً
متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟	
اضطرابات الجهاز الهضمي في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع إسهال متكرر جداً، والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم آلام حادة في المعدة أعراض تشير إلى زيادة خلايا الدم البيضاء ضيق في التنفس، حمى، العُقد اللمفاوية، آلام العظام زيادة الوزن السريعة، قصور كلوي أعراض تشير إلى متلازمة انحلال الورم تلون البول انخفاض كمية التبول ألم في جانب واحد تحت الأضلاع	تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة
كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟	
الوزن	راقب وزنك بانتظام في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي
كيفية ضبط نظامك الغذائي؟	
الإسهال	انتق نظاماً غذائياً ذا نسبة قليلة من الألياف. يفضل تناول النشويات والجزر والموز. تجنب تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول. اشرب الكثير من الماء، إذا أمكن 2 لتر يومياً
الغثيان	انتق نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة
فقدان الشهية	انتق نظاماً غذائياً غنياً بالسعرات الحرارية و"نظاماً غذائياً ممتعاً"
اضطراب الذوق	اعتمد تناول الطعام الفاتر أو البارد مقسماً إلى عدة وجبات صغيرة في اليوم تجنب أدوات المطبخ المعدنية

