



ETOPOSIDE - CELLTOP®

რა არის CELLTOP-ი

მოლეკულის აღწერა	აღწერა
ეტოპოზიდი	25 მგ რბილი კაფსულა 50 მგ რბილი კაფსულა 

როგორ უნდა მიიღოთ წამალი?

წამლის დოზირება განსაზღვრულია თქვენი ექიმის მიერ.
თქვენს შემთხვევაში, არის მგ/დღეში, ანუ 25 მგ-იანი კაფსულა და 50 მგ-იანი
კაფსულა, რომელიც უნდა მიიღოთ ჯერ დღეში.
ციკლი გრძელდება კვირა, CELLTOP®-ი უნდა მიიღოთ ზედიზედ დღის განმავლობაში,
შემდეგ კი შეწყვიტოთ დღით.
გადაყლაპეთ მთლიანად, ერთ ჭიქა წყალთან, კაფსულის გახსნის ან განზავების გარეშე, მიიღეთ
ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეშე.
დავინწყების ან ლებინების შემთხვევაში: არ მიიღოთ დამატებითი დოზა, დაელოდეთ შემდეგ მიღებას.

დოზირება - მიღების წესი

2 ან 3 მიღება დღეში, ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეშე			
მიიღეთ ზედიზედ 21 დღე ყოველ 28 დღეში (7 დღიანი მესვენება)	 ... 	 ... 	დ1 ... დ21 ... დ22 ... დ28
მიიღეთ 3-დან 5 დღემდე ყოველ 28 დღეში	 ... 	 ... 	დ1 ... დ5 ... დ6 ... დ28
მიიღეთ 3-დან 5 დღემდე ყოველ 21 დღეში	 ... 	 ... 	დ1 ... დ5 ... დ6 ... დ21

როგორ მოიქცეთ, რომ არ გამოგელით მარაგი?

ეს წამალი ხელმისაწვდომია ქალაქის აფთიაქებში.
მის მიწოდებას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო. ყურადღებით იყავით და წინასწარ დაგეგმეთ
თქვენი რეცეპტის განახლება.
შეინახეთ ეს წამალი ორიგინალ შეფუთვაში, სითბოსა და ტენიანობისგან დაცულ ადგილას.

სხვა რა ინფორმაცია უნდა იცოდეთ?

გამაფრთხილებელი ზომები და მეთვალყურეობა
თქვენი მედიკამენტის მიღება საჭიროებს ბიოლოგიურ მეთვალყურეობას (სისხლის საერთო ანალიზის აღება,
რომელიც საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ სისხლის ანალიზის მაჩვენებლებს თითოეული ციკლის
დანახებამდე და თირკმლის ფუნქციას) და კლინიკურ მეთვალყურეობას (არტერიული წნევა).
კონტრაცეფცია
ეს წამალი შეიძლება ზიანს აყენებდეს ჩანასახს. თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა მკურნალობის მთელი

პერიოდის განმავლობაში და მისი შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ ეფექტური კონტრაცეპტული მეთოდები (პრეზერვატივი და დამატებითი მეთოდი).

მედიკამენტებთან და/ან კვებასთან ურთიერთქმედება
CELLTOP®-ის სხვა პრეპარატებთან ერთად მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ეფექტები (პრეპარატის ეფექტურობისა და ამტანობის შემცირება). ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ფარმაცევტი და მკურნალი ექიმი ინფორმირებული იყვნენ ყველა იმ მედიკამენტის და/ან სხვა ნივთიერებების (საკვები პროდუქტები, მცენარეები, პრობიოტიკები, ეთერზეთები, საკვები დანამატები და სხვ.) შესახებ, რომელსაც იღებთ

მაგალითი: მოერიდეთ Olivier-ს (ზეთისხილის) მოხმარებას CELLTOP®-თან ერთად.

რომელია არასასურველი გვერდითი მოვლენები?

ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენები ჩამოთვლილია ქვემოთ. ასევე შესაძლოა სხვა გვერდითი ეფექტებიც გამოვლინდეს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით მედიკამენტის ინსტრუქციას ან მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი მოვლენები	
ყველაზე ხშირი	ბიოლოგიური ანალიზის ანომალიები: ჰემოგლობინის (ანემია), სისხლის თეთრი უჯრედების (ლეიკოპენია), პოლინუკლეარული ნეიტროფილების (ნეიტროპენია) და თრომბოციტების (თრომბოციტოპენია) შემცირება, ღვიძლის შეფასების ანომალია. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევები: მუცლის ტკივილი, წონის დაკლება, კუჭის შეკრულობა, გულისრევა, ღებინება, დიარეა, პირის ღრუს ანთება (პირის ღრუს წყლულები) კანის დარღვევები: თმის ცვენა, ქავილი, გამონაყარი, კანის პიგმენტაცია სხვა: დაღლილობა, სისუსტე, თავბრუსხვევა გულის ფუნქციის დარღვევები, მაღალი არტერიული წნევა
ზოგ პაციენტს ესაჩიროება განსაკუთრებული ყურადღება	ფრუქტოზის აუტანლობის მქონე პაციენტები
როდის უნდა მიმართოთ სამედიცინო ჯგუფს?	

გააფრთხილეთ სამედიცინო გუნდი შემდეგ შემთხვევებში, თუ არ გაქვთ მიღებული კონკრეტული სამედიცინო რეკომენდაციები	მომწვევად სისტემის დარღვევები > წონის სწრაფი და/ან მნიშვნელოვანი კარგვა > ძალიან ხშირი დიარეა, დღეში 4-ზე მეტჯერ კუჭში გასვლა > პირის ღრუს ტკივილი ან წყლულები, რომლებიც ხელს უშლის ნორმალურ კვებას > ინტენსიური ტკივილი მუცლის არეში > 24 საათის განმავლობაში დაღუპვის და/ან დაახლოებით 48 საათის განმავლობაში ჭამის შეუძლებლობა. > კვირაში 3-ზე ნაკლები კუჭში გასვლა ინფექციის მაჩვენებელი სიმპტომები > ტემპერატურა > 38,5 °C > ხველება, ყელის ტკივილი, ტკივილი შრდვისას, დიარეა და სიცხე ერთად სისხლდენის მაჩვენებელი სიმპტომები > სისხლი განავალში ან ღებინების დროს > სისხლჩაქცევები (სილურჯეები), ცხვირიდან სისხლდენა ინფექციის მაჩვენებელი სიმპტომები > თავის ტკივილი, ყურებში ზუზუნის და/ან თავბრუსხვევა > დასაშვები ციფრების ზრდა არტერიული წნევის გაზომვისას გულის პრობლემის მაჩვენებელი სიმპტომები > სუნთქვის უკმარისობა, გულის ფრიალი, წნეხი გულმკერდის არეში ფილტვების არეში დარღვევები > დიდხანსი ხველების გაუარესება ან სუნთქვის გართულება ლიზისის სინდრომის მიმანიშნებელი სიმპტომები > შარდის შეფერილობა > გამოყოფილი შარდის რაოდენობის შემცირება > ტკივილი ერთ მხარეს ნეკნების ქვეშ კანის დარღვევები > დიდი ბუშტუკების გაჩენა კანზე ან კანის მნიშვნელოვანი აქერცვლა
როგორ უნდა მოახდინოთ გვერდითი მოვლენების პრევენცია?	
ინფექცია	მოერიდეთ რისკის შემცველ ადგილებს (ხალხმრავლობა, ავადმყოფებთან კონტაქტი და ა.შ.). რეკომენდებულია პნევმოკოკისა და გრიპის საწინააღმდეგო აცრა: ის თქვენ დაგიცავთ.
წონა	გააკონტროლეთ რეგულარულად თქვენი წონა კუჭ-ნაწლავის დარღვევების დროს
დაღლილობა	ამჯობინეთ ისეთი აქტივობები, რომლებიც თქვენს კარგად ყოფნას უწყობს ხელს, განსაკუთრებით კი ადაპტირებული და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა: სიარული, ცურვა, ველოსიპედით სიარული, სპორტი და ა.შ. ჩაანაცვლეთ აქტივობის პერიოდი დასვენებით და პირიქით.
სტომატოლოგიური ჰიგიენა	გამოიყენეთ რბილი კბილის ჭაგრისი და გამოიყენეთ პირის ღრუს საკვები ნატრიუმის ბიკარბონატით. მოერიდეთ მენტოლის ან ალკოჰოლის შემცველ პირის ღრუს საკვებს.
სისხლდენა, სისხლჩაქცევები	მოერიდეთ ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღებას (იბუპროფენი, ასპირინი და ა.შ.) აცნობეთ თქვენს ექიმს: > თუ იღებთ ანტიკოაგულანტებს ან თრომბოციტების ანტიაგრეგანტულ პრეპარატებს: საჭიროა მკაცრი მონიტორინგი > ქირურგიული ან სტომატოლოგიური ჩარევის შემთხვევაში
თმის ცვენა	შეიქვრიეთ თმა. მოიძიეთ ინფორმაცია პარიკებსა და მათ დაფინანსებაზე. გამოიყენეთ გამოიყენეთ რბილი შამპუნი (ჩვილებისთვის განკუთვნილი) მცირე დოზით. უპირატესობა მიანიჭეთ რბილ კბილის ჭაგრისს თავიდან აიცილეთ თმის ძალიან ხშირი დაბანა. მოერიდეთ სითბოს წყაროებს (ფენი, ცხელი ბიგუდები, თმის



	დასასწორებელი უთოები), თმის შეღებვას, მელორებას და ქიმიურ დახვევას.
კუჭის შეკრულობა	კიჭ-ნაწლავის ტრანზიტის სტიმულირებისთვის, დაკავდით ადაპტირებული და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა: სიარული, მებაღეობა, ცურვა, ველოსიპედით სიარული, სპორტი და ა.შ.
როგორ უნდა დაიწყოთ ადაპტირებული კვება?	
გულის რევის შეგრძნება	უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაგმენტულ კვებას, რომელიც გადანაწილებულია რამდენიმე მსუბუქ რაციონად. საკვები უნდა იყოს თხევადი და ცივი. შეზღუდეთ ცხიმოვანი, შემწვარი და ცხარე საკვები.
წონის დაკარგვა	უპირატესობა მიანიჭეთ უფრო კალორიულ საკვებს და „გემრიელ კვებას“.
კუჭის შეკრულობა	უპირატესობა მიანიჭეთ ბოჭკოვანით გამდიდრებულ დიეტას. დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით.
დიარეა	უპირატესობა მიანიჭეთ დაბალ ბოჭკოვან დიეტას. სასურველია, მიირთვათ სახამებლიანი პროდუქტები, სტაფილო და ბანანი. მოერიდეთ უმ ხილს და ბოსტნეულს, რძის პროდუქტებს, ყავას და ალკოჰოლს. დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით.
ანთება პირის ღრუში (წყლულები)	მოერიდეთ მჟავე ან წებოვანი საკვების მიღებას და ძალიან მარილიან საკვებს.

