



لومستين - بيلوستين® LOMUSTINE - BELUSTINE®

ما هو دواء بيلوستين

وصف الجزيء	الوصف
لومستين	كبسولة 40 ملغ: زرقاء
	

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك.
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ خلال أسابيع، أي..... كبسولة (كبسولات) 40 ملغ يتم تناولها مرة واحدة كل أسابيع.
تُبَلع الكبسولات كاملة مع كوب من الماء، دون فتح الكبسولات أو تذويبها.
تُؤخذ في وقت محدد. بعيداً عن وجبة العشاء (3 ساعات بعد الوجبة).
في حالة نسيان الجرعة، يمكن تناول الجرعة خلال 24 ساعات. أبلغ طبيب الأورام الخاص بك. أما في حالة التقوُّص: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

الجرعة - كيفية تناول الدواء

جرعة واحدة، في وقت محدد، 3 ساعات بعد العشاء	  
يوم واحد (1) كل 6 أسابيع	      
	      

كيفية التحكّم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدّم الكامل ووظائف الكبد والكلّي) ومراقبة سريرية (فحوصات قياس التنفس).
منع الحمل
قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى و/أو نظامك الغذائي
قد يكون للتفاعلات بين BELUSTINE® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية و/أو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).
مثال: تفاد تناول الزيتون مع BELUSTINE®

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية	
الأكثر شيوعاً	خلل في الفحص البيولوجي: انخفاض في الكريات البيضاء (ندرة الكريات البيضاء)، انخفاض في الصفائح الدموية (قلة الصفائح) اضطرابات الجهاز الهضمي: الغثيان، التقيؤ (من 3 إلى 6 ساعات بعد تناول BELUSTINE® وما يصل إلى 24 ساعة بعد تناوله) العمى لدى الرجال والنساء
يحتاج بعض المرضى إلى عناية خاصة	المرضى الذين لا يتحملون اللاكتوز المرضى الذين يعانون من الداء البطني
متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟	
يجب تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة	اضطرابات الجهاز الهضمي < في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع < آلام حادة في المعدة < عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة و/أو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً أعراض تشير إلى العدوى < درجة حرارة تفوق 38.5 درجة مئوية < سعال، ألم في الحلق، ألم عند التبول، إسهال مع حمى اضطرابات على مستوى الرئة < ازدياد السعال المستمر أو صعوبة التنفس أعراض تشير إلى النزف < دم في البراز، أو عند التقيؤ < الأورام الدموية (الكدمات)، نزيف الأنف
كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟	
التعامل مع دواء مضاد للسرطان	تجنب ملامسة الكبسولات للجلد. ارتد قفازات واغسل يديك بعد الاستعمال
العمى	اسأل طبيبك قبل بدء العلاج عن طرق الحفاظ على البويضات والأمشاج
العدوى	تجنب الذهاب إلى الأماكن التي تُشكّل خطورة عليك (الحشود، والاحتكاك بالمرضى، وما إلى ذلك). قد يوصى بالتطعيم ضد الأنفلونزا والمكورات الرئوية: من أجل الوقاية
النزيف	تجنب تناول مضادات الالتهاب (الإيبوبروفين والأسبرين وغيرها) أخبر طبيبك: < إذا كنت تستهلك مضادات التخثر أو مضادات الصفائح الدموية فإن المراقبة الدقيقة ضرورية < في حالة مداخل جراحية أو جراحة الأسنان
الوزن	راقب وزنك بانتظام في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي
نظافة الأسنان	استخدم فرشاة أسنان ناعمة احرص على غسل الفم ببيكربونات الصوديوم تجنب غسول الفم الذي يحتوي على المنثول أو الكحول
كيفية ضبط نظامك الغذائي؟	
الغثيان	ابتعد نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة