



MIDOSTAURINE - RYDAPT® ريدابت - ميدوستورين

ما هو دواء ريدابت

وصف الجزيء	الوصف
ميدوستورين	كبسولة 25 ملغ: برتقالية
	

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدد جرعة علاجك من قبل طبيبك.
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي كبسولة (كبسولات) 25 ملغ يتم تناولها مرتان (2) في اليوم.
تُبلع الكبسولات كاملة مع كوب من الماء، دون فتح الكبسولات أو تذويبها.
تؤخذ في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة.
في حالة النسيان أو التقيو: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

الجرعة - كيفية تناول الدواء

  	جرعتان (2) في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبات
	بشكل مستمر (علاج أحادي) أو بشكل متقطع حسب البروتوكول (علاج مشترك)

كيفية التحكم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدم الكامل ونسبة السكر في الدم والبوتاسيوم ووظائف الكبد) ومراقبة سريرية (تخطيط القلب الكهربائي).
منع الحمل
قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى وأو نظامك الغذائي
قد يكون للتفاعلات بين RYDAPT® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية وأو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).
مثال: تفاد تناول نبتة سانت جون والجريب فروت مع RYDAPT®

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الأكثر شيوعاً	خلل في الفحص البيولوجي: انخفاض في كريات الدم البيضاء (قلة الكريات البيض، قلة العدلات)، في الهيموجلوبين (فقر الدم)، في الصفائح الدموية (قلة الصفائح)، ارتفاع نسبة السكر في الدم اضطرابات الجهاز الهضمي: الغثيان، التقيؤ، الإسهال، التهاب الفم (تقرحات الفم) اضطرابات الجلد: الطفح الجلدي، الجفاف، تحسس من الشمس اضطراب في وظائف القلب: بما في ذلك حالات انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، انتفاخ الساقين و/أو الذراعين (وذمة) اضطرابات على مستوى الرئتين أخرى: نزيف الأنف، صداع، آلام المفاصل
يحتاج بعض المرضى إلى عناية خاصة	مرضى السكري (ارتفاع نسبة السكر في الدم)
تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة	اضطرابات الجهاز الهضمي في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع إسهال متكرر جداً، والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم آلام حادة في المعدة عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة و/أو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً أعراض تشير إلى العدوى درجة حرارة تفوق 38.5 درجة مئوية سعال، ألم في الحلق، ألم عند التبول، إسهال مع حمى اضطرابات على مستوى الرئتين ازدياد السعال المستمر أو صعوبة التنفس آلام تعيقك عن ممارسة نشاطاتك المعتادة صداع آلام المفاصل أعراض تشير إلى وجود اضطراب في القلب ضيق في التنفس، خفقان القلب أو ألم أو ضيق في الصدر
الوزن	راقب وزنك بانتظام في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي الوزمة
العدوى	تجنب الذهاب إلى الأماكن التي تشكل خطورة عليك (الحشود، والاحتكاك بالمرضى، وما إلى ذلك). قد يُوصى بالتطعيم ضد الأنفلونزا والمكورات الرئوية: من أجل الوقاية
العناية بالبشرة	استخدم صابوناً لطيفاً للبشرة وعامل ترطيب عند الغسل وتجفيف البشرة بالطبقة. تجنب أي استخدام للمنتجات المهيجة الحماية من أشعة الشمس، استخدم كريم واقي من أشعة الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس
متابعة ضغط الدم	يُوصى بقياس ضغط الدم بانتظام. يمكن للصّابدة مساعدتك في قياس ضغط دمك. يمكنك أيضاً أن تطلب القيام بذلك بنفسك باستخدام جهاز قياس ضغط الدم الذاتي
كيفية ضبط نظامك الغذائي؟	
الإسهال	اتّبق نظاماً غذائياً ذا نسبة قليلة من الألياف. يفضل تناول النشويات والجزر والموز تجنب تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول اشرب الكثير من الماء
الغثيان	اتّبق نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة. قلّل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة

