



ميتوتان - ليسودرين® MITOTANE - LYSODREN®

ما هو دواء ليسودرين

وصف الجزيء	الوصف
ميتوتان	قرص 500 ملغ: أبيض وقابل للكسر

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك.
في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي..... قرص (أقرص) 500 ملغ يتم تناولهامرة في اليوم، يومياً.
تُبَلع الأقرص كاملةً مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو مضغها أو تخفيفها.
تؤخذ في وقت محدد، أثناء تناول وجبة غنية بالدهون.
في حالة النسيان أو التقيؤ: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

الجرعة - كيفية تناول الدواء

	جرعتان (2) إلى ثلاث (3) جرعات في اليوم، في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة (غنية بالدهون)
	بشكل مستمر

كيفية التحكّم في مخزون العلاج الخاص بك؟


هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدّم الكامل ووظائف الكبد والغدة الدرقية ونسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية).
منع الحمل
قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى و/أو نظامك الغذائي
قد يكون للتفاعلات بين LYSODREN® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية و/أو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).
مثال: تقاد تناول الأرقطيون، البولودو، حمم مخزني، الجنكو بيلوبا، ملكة المروج، البرسيم الأحمر مع LYSODREN®

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية	
اضطرابات الجهاز الهضمي: الإسهال، الغثيان، التقيؤ، فقدان الوزن، ارتجاع الحمض اضطرابات عصبية: نعاس، دوخة، ارتباك، تدمير، اضطرابات الحساسية خلل في الفحص البيولوجي: خلل في فحص الكبد، فرط كوليستيرول الدم، فرط ثلاثي غليسريد الدم، انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء (قلة الكريات البيض)، انخفاض في مستوى الهيموغلوبين (فقر الدم)، انخفاض في عدد الصفائح الدموية (نقص الصفائح) أخرى: طفح جلدي، تعب، نزيف، الإرهاق العضلي، حساسية التّدي وتورّمه قصور الغدة الكظرية	الأكثر شيوعاً
متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟	
أعراض تشير إلى العدوى درجة حرارة تفوق 38.5 درجة مئوية سعال، ألم في الحلق، ألم عند التبول، إسهال مع حمى إصابة، صدمة أعراض تشير إلى النزف دم في البراز، أو عند التقيؤ الأورام الدموية (الكدمات)، نزيف الأنف اضطرابات الجهاز الهضمي في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع إسهال متكرر جداً، والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم آلام حادة في المعدة عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة و/أو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً اضطرابات عصبية اضطرابات في الحركة والتنسيق، أحاسيس غير طبيعية مثل التدمير والوخز، فقدان الذاكرة، صعوبة في التحدث دوخة قصور الغدة الكظرية تعب، آلام البطن، الغثيان، التقيؤ، الإسهال، ارتباك	يجب تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة
كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟	
احمل معك بطاقة المريض الخاصة بـ LYSODREN ® في حالة الطوارئ، يجب أن يعرف الفريق الطبي أنك تتلقى علاجاً بواسطة LYSODREN® حالياً	قصور الغدة الكظرية
	
راقب وزنك بانتظام في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي	الوزن
تجنب تناول مضادات الالتهاب (الإيبوبروفين والأسبرين وغيرها) أخبر طبيبك: إذا كنت تستهلك مَصَادَات التَّخَثُّر أو مَصَادَات الصَّفَائِحِ الدَّمَوِيَّةِ فإنَّ المراقبة الدقيقة ضرورية في حالة مداخلة جراحية أو جراحة الأسنان	نزيف، نزف
اختر الأنشطة التي توفر لك الراحة، وعلى وجه الخصوص، نشاط بدني ملائم ومنتظم: المشي والبيستنة والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها احرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة	التعب

العناية بالبشرة	استخدم صابوناً لطيفاً للبشرة وعامل ترطيب عند <i>الغسل</i> وجفّف البشرة بالطبعية تجنّب أي استخدام للمنتجات المهيجة للحماية من أشعة الشمس، استخدم كريم واقى من أشعة الشمس وتجنّب التعرض لأشعة الشمس
التعامل مع أدوية مضاد للسرطان	تجنّب ملامسة الكبسولات للجلد. ارتدِ قفازات واغسل يديك بعد الاستعمال
كيفية ضبط نظامك الغذائي؟	
الغثيان	انتقِ نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة
الإسهال	انتقِ نظاماً غذائياً ذا نسبة قليلة من الألياف. يفضل تناول النشويات والجزر والموز تجنّب تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول اشرب الكثير من الماء
فقدان الوزن	انتقِ نظاماً غذائياً غنياً بالسعرات الحرارية و"نظاماً غذائياً ممتعاً"