



## Застосування протизапальних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

## Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між БОСУЛІФОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

*Приклад:* При прийманні БОСУЛІФА® слід уникати вживання звіробію, грейпфрута, больдо, фукуса, азіатського женьшеню, пасифлори.

## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**

ПОБІЧНІ ЯВИЩА	
Найбільш поширені	<p><b>Порушення травлення:</b> діарея, нудота, біль в животі, блювота</p> <p><b>Відхилення в результатах аналізу крові:</b> зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенія) та (чи) багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія), низький рівень гемоглобіну (анемія)</p> <p><b>Проблеми зі шкірою:</b> висип, свербіж</p> <p><b>Утримання води:</b> набряк кінцівок та (чи) обличчя</p> <p><b>Інші:</b> підвищена температура, стомленість, головний біль, порушення функції печінки</p>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	Пацієнти – хронічні носії вірусу гепатита Б (ризик реактивації захворювання)
ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p><b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Температура &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про гіпертонію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення</li> <li>&gt; Збільшення показників артеріального тиску</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця чи утримання води</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Втрата свідомості, прискорене серцебиття</li> <li>&gt; Набряк щиколоток, стоп або гомілок, утруднене дихання</li> <li>Занадто швидке та несподіване збільшення ваги</li> </ul> <p><b>Порушення травлення</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Суттєва та (або) швидка втрата ваги</li> <li>&gt; Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу</li> <li>&gt; Сильний біль у животі</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про синдром лізису</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Фарбування сечі</li> <li>&gt; Зменшення кількості сечі, що виділяється</li> <li>&gt; Біль у боці під ребрами</li> </ul>
ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?	
Інфекція	<b>Уникайте</b> відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується <b>регулярно вимірювати</b> артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Вага	При розладах травлення або утриманні води <b>регулярно перевіряйте свою вагу.</b>
Догляд за шкірою	<b>Робіть вибір на користь</b> м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. <b>Уникайте</b> використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <b>Для захисту від сонця використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.



Стомленість	<b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.
Утримання води (набряк кінцівок)	<b>Уникайте</b> занадто тісного одягу, шкарпеток та взуття. <b>Кладіть</b> ноги у високе положення. <b>Регулярно перевіряйте свою вагу.</b>
<b>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</b>	
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль моркву, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Утримання води	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низькою кількістю солі.

