



## بازوبانيب - فوتريينت® PAZOPANIB - VOTRIENT

ما هو دواء فوتريينت

وصف الجزيء	الوصف
بازوبانيب	قرص 200 ملغ: وردي وبيضاوي قرص 400 ملغ: أبيض وبيضاوي 

### كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك. في حالتك، تقدر الجرعة ب..... ملغ في اليوم، أي..... قرص (أقرص) 200 ملغ، و/أو..... قرص (أقرص) 400 ملغ، يتم تناوله جرعة واحدة يوميًا. تُبلع الأقرص كاملةً مع كوب من الماء، دون سحقها أو تقطيعها أو مضغها أو تخفيفها. تُؤخذ في وقت محدد، بعيداً عن أي وجبة (ساعة واحدة قبل الوجبة أو ساعتين بعد الوجبة). في حالة النسيان أو التقيؤ: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

### الجرعة - كيفية تناول الدواء

 <سا2 >سا1  <سا2 >سا1  <سا2 >سا1	جرعة واحدة كل 24 ساعة، في وقت محدد، قبل ساعة واحدة أو ساعتين بعد الوجبة.
	بشكل مستمر

### كيفية التحكم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة. وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً. يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

### ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

#### الاحتياطات والمراقبة

يقترض تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدم الكامل ووظائف الكبد والكلية والغدة الدرقية ومستوى البوتاسيوم ووجود البروتينات في البول) ومراقبة سريرية (تخطيط القلب الكهربائي، قياس ضغط الدم، مخطط صدى القلب). منع الحمل

قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى و/أو نظامك الغذائي

قد يكون للتفاعلات بين VOTRIENT® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية و/أو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).

مثال: تفاد تناول نبتة سانت جون وعصير الجريب فروت مع VOTRIENT®

## ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

## الآثار الجانبية

<p><b>اضطرابات الجهاز الهضمي:</b> الإسهال، الغثيان، فقدان الوزن، التقيؤ، تغيير الدَّق، التهاب الفم (التهاب الفم)، آلام البطن، فقدان الشهية</p> <p><b>اضطرابات الجلد:</b> تغيير في لون الشعر والجلد، طفح جلدي، التهاب في راحتي اليدين، وأخمص القدمين ومناطق الاحتكاك، تساقط الشعر (بصفة معتدلة)</p> <p><b>الأم:</b> صداع، آلام أخرى</p> <p><b>خلل في الفحص البيولوجي:</b> خلل في فحص الكبد، انخفاض في خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء)، في العدلات متعددة النوى (قلة العدلات)، في الصفائح الدموية (قلة الصفيحات)، وجود بروتينات في البول</p> <p><b>اضطرابات الأوعية الدموية:</b> نزيف، ارتفاع ضغط الدم</p> <p><b>أخرى:</b> تعب، اضطراب النوم، عدم وضوح الرؤية</p>	<p>الأكثر شيوعاً</p>
<p><b>اضطرابات الجهاز الهضمي</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع</li> <li>&lt; إسهال متكرر جداً، والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم</li> <li>&lt; ألم أو تقرحات في الفم تمنع اتباع نظام غذائي طبيعي</li> <li>&lt; آلام حادة في المعدة</li> <li>&lt; عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة و/أو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً</li> <li>&lt; إفرازات أو خراج أو ألم في فتحة الشرج</li> <li>&lt; <b>أعراض تشير إلى ارتفاع ضغط الدم</b></li> <li>&lt; الصداع، وطنين في الأذنين و/أو الدوخة</li> <li>&lt; ارتفاع الأعداد عند قياس ضغط الدم</li> <li>&lt; <b>أعراض تشير إلى العدوى</b></li> <li>&lt; درجة حرارة تفوق 38.5 درجة مئوية</li> <li>&lt; سعال، ألم في الحلق، ألم عند التبول، إسهال مع حمى</li> <li>&lt; <b>أعراض تشير إلى النزف</b></li> <li>&lt; دم في البراز، أو عند التقيؤ</li> <li>&lt; الأورام الدموية (الكدمات)، نزيف الأنف</li> <li>&lt; <b>أعراض تشير إلى وجود اضطراب في القلب أو إلى التهاب الوريد</b></li> <li>&lt; ضيق في التنفس أو خفقان القلب أو ألم أو ضيق في الصدر، فقدان الوعي، انتفاخ الساقين</li> <li>&lt; ضعف في أحد جانبي الجسم، صداع شديد، نوبات، ارتباك، صعوبة في التحدث، تغيرات في الرؤية أو دوخة شديدة</li> <li>&lt; احمرار وسخونة وألم على مستوى عضلة الساق</li> <li>&lt; <b>أعراض تشير إلى وذمة دماغية</b></li> <li>&lt; صداع شديد، ارتباك، نوبات أو اضطرابات في الرؤية</li> <li>&lt; <b>اضطرابات على مستوى الرئتين</b></li> <li>&lt; ازدياد السعال المستمر أو صعوبة التنفس</li> </ul>	<p>يجب تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة</p>
<b>كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟</b>	
<p>من الضروري ضبط ضغط الدم العالي. يُوصى بقياس ضغط الدم بانتظام. يمكن للصيادلة مساعدتك في قياس ضغط دمك. يمكنك أيضاً أن تطلب القيام بذلك بنفسك باستخدام جهاز قياس ضغط الدم الذاتي</p>	<p>متابعة ضغط الدم</p>
<p>راقب وزنك بانتظام في حالة وجود مشاكل في الجهاز الهضمي الوذمة</p>	<p>الوزن</p>



<p><b>اليدين والقدمين:</b> ضع كريم أو حليب مرطب و/أو كريم علاجي على اليدين والقدمين (دون الفرك بقوة) <b>تجنب</b> تعريض يديك وقدميك للحرارة (الماء الساخن) <b>تجنب</b> الأنشطة التي تسبب الاحتكاك أو الجروح وتجنب كذلك ارتداء الملابس والجوارب والأحذية الضيقة</p> <p><b>الجسم:</b> استخدم صابوناً لطيفاً للبشرة وعامل ترطيب عند <b>الغسل</b> وتجفيف البشرة بالطبقة <b>تجنب</b> أي استخدام للمنتجات المهيجة <b>للحماية من أشعة الشمس، استخدم</b> كريم واقى من أشعة الشمس <b>وتجنب</b> التعرض لأشعة الشمس</p> <p><b>الشعر:</b> استخدم كمية صغيرة من شامبو لطيف (للأطفال الرضع) <b>اختر</b> فرشاة شعر ناعمة. <b>تجنب</b> غسل شعرك بشكل متكرر. <b>تجنب</b> مصادر الحرارة (مجففات الشعر، وأدوات تجعيد الشعر الساخنة، ومكواة الشعر الساخنة)، والصبغات، والتلوين المتدرج للشعر، وتجعيد الشعر</p>	العناية بالبشرة والشعر
<p>استخدم فرشاة أسنان ناعمة <b>احرص</b> على غسل الفم ببيكربونات الصوديوم <b>تجنب</b> غسول الفم الذي يحتوي على المنثول أو الكحول</p>	نظافة الأسنان
<p><b>تجنب</b> تناول مضادات الالتهاب (الإيبوبروفين والأسبرين وغيرها) <b>أخبر طبيبك:</b></p> <p>← إذا كنت تستهلك <b>مُضادات التَّخثر أو مضادات الصفائح الدموية</b> فإنَّ المراقبة الدقيقة ضرورية</p> <p>← إذا كنت مقبلاً على <b>مداخلة جراحية أو جراحة الأسنان</b></p>	نزيف/ نزف
<p><b>تجنب</b> الذهاب إلى الأماكن التي تُشكّل خطورة عليك (الحشود، والاحتكاك بالمرضى، وما إلى ذلك). <b>قد يوصى بالتطعيم</b> ضد الأنفلونزا والمُكورات الرئويّة: من أجل الوقاية</p>	العدوى
<b>كيفية ضبط نظامك الغذائي؟</b>	
<p><b>انتق</b> نظاماً غذائياً ذا نسبة قليلة من الألياف. <b>يفضّل تناول</b> النشويات والجزر والموز <b>تجنب</b> تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول <b>اشرب</b> الكثير من الماء</p>	الإسهال
<p><b>انتق</b> نظاماً غذائياً غنياً بالسعرات الحرارية و"نظاماً غذائياً ممتعاً"</p>	فقدان الوزن
<p><b>انتق</b> نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة <b>قلل</b> من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة</p>	الغثيان
<p><b>تفاد</b> تناول الأطعمة الحمضية أو اللزجة والأطعمة شديدة الملوحة</p>	التهاب الفم (تقرحات الفم)
<p><b>اعتمد</b> تناول الطعام الفاتر أو البارد مقسماً إلى عدة وجبات صغيرة في اليوم <b>تجنب</b> أدوات المطبخ المعدنية</p>	اضطراب الذوق

