



## Что такое ВЕРЗЕНИО®

Название препарата	Описание
Абемациклиб	Таблетка 50 мг: бежевая Таблетка 100 мг: белая Таблетка 150 мг: жёлтая

## Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. по 1 таблетке..... мг 2 раза в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая и не раздробляя таблетки. Принимать в установленное время, во время или вне еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

## Дозировка – схема приёма

Два раза в день, в установленное время, с едой или без еды									
Без перерыва									
	д1	д2	д3	д4	д5	д6	д7	...	д28

## Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеках по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

## Что ещё нужно знать?

### Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции почек и печени), а также мониторинг клинического состояния.

### Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

### Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ВЕРЗЕНИО® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

*Пример:* При приёме ВЕРЗЕНИО® следует избегать употребления зверобоя и грейпфрутового сока.

## Каковы возможные побочные явления?

**Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.**

### ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ



Самые распространённые	<p><b>Нарушения пищеварения:</b> диарея, тошнота, рвота, нарушение вкусового восприятия, потеря аппетита</p> <p><b>Отклонения в результатах лабораторных исследований:</b> низкое содержание многоядерных нейтрофилов (нейтропения) и тромбоцитов (тромбопения), низкий уровень гемоглобина (анемия), отклонение от нормы печеночных проб</p> <p><b>Проблемы с кожей:</b> сыпь, сухость, зуд, выпадение некоторого количества волос</p> <p><b>Проблемы с глазами:</b> чрезмерное слезотечение</p> <p><b>Проблемы, относящиеся к сосудистой системе:</b> флебит</p> <p><b>Прочие:</b> инфекции, усталость, головокружение</p>
------------------------	--

**О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?**

Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p><b>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Температура &gt; 38,5 °C</li> <li>&gt; Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой</li> </ul> <p><b>Нарушения пищеварения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Существенная и (или) быстрая потеря веса</li> <li>&gt; Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки</li> <li>&gt; Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов</li> </ul> <p><b>Симптомы, свидетельствующие о флебите</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Красная, горячая и болезненная икра</li> </ul> <p><b>Респираторные заболевания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Постоянный усиливающийся кашель или трудности с дыханием</li> </ul>
--	--

**КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?**

Инфекция	<p><b>Избегайте</b> посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...). Вам может быть <b>рекомендована прививка</b> от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.</p>
Вес	<p>При расстройствах пищеварения <b>регулярно проверяйте свой вес.</b></p>
Усталость	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт...</p> <p><b>Чередуйте</b> периоды активности и отдыха.</p>
Глаза	<p><b>Избегайте</b> носить контактные линзы. <b>Избегайте</b> водить машину при слабой освещённости.</p>
Выпадение волос	<p><b>Используйте</b> небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). <b>Делайте выбор в пользу</b> мягкой щётки. <b>Избегайте</b> слишком частого мытья волос. <b>Избегайте</b> источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки.</p>

**КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?**

Диарея	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно <b>употреблять</b> продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы.</p> <p><b>Избегайте</b> употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя.</p> <p><b>Пейте</b> побольше воды.</p>
Тошнота	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд.</p> <p><b>Ограничьте</b> потребление жирной, жареной и острой пищи.</p>
Потеря аппетита	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> более калорийной диеты и «диеты удовольствия».</p>
Нарушения вкусового восприятия	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день.</p> <p><b>Избегайте</b> употребления металлических кухонных принадлежностей.</p>

