




Что такое БОСУЛИФ®

Название препарата	Описание
Босутиниб	<p>Таблетка 100 мг: овальная, жёлтая Таблетка 500 мг: овальная, красная</p>  <p>Orange tablets are 400 mg Red tablets are 500 mg Yellow tablets are 100 mg</p>

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. таблеток 100 мг и таблеток 500 мг один раз в день каждый день. Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

В установленное время, во время еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, во время еды								
Без перерыва								
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеке по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественного состава крови, функции печени, уровня калия, магния и триглицеридов), а также мониторинг клинического состояния (электрокардиограмма).



Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между БОСУЛИФОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме БОСУЛИФА® следует избегать употребления зверобоя, грейпфрута, больдо, фукуса, азиатского женьшеня, пассифлоры.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	<p>Нарушения пищеварения: диарея, тошнота, боль в животе, рвота</p> <p>Отклонения в результатах анализа крови: низкое содержание тромбоцитов (тромбоцитопения) и (или) многоядерных нейтрофилов (нейтропения), низкий уровень гемоглобина (анемия)</p> <p>Проблемы с кожей: сыпь, зуд</p> <p>Удержание воды: отёк конечностей и (или) лица</p> <p>Прочие: повышенная температура, усталость, головные боли, нарушение функции печени</p>
Некоторые пациенты требуют особого внимания	Пациенты – хронические носители вируса гепатита Б (риск реактивации заболевания)
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции</p> <ul style="list-style-type: none"> > Температура > 38,5 °C > Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой <p>Симптомы, свидетельствующие о гипертонии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли, шум в ушах и (или) головокружение > Увеличение показателей артериального давления <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца или удержании воды</p> <ul style="list-style-type: none"> Потеря сознания, учащённое сердцебиение > Отек лодыжек, стоп или голеней, затруднённое дыхание > Быстрое и необъяснимое увеличение веса <p>Проблемы с пищеварением</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Сильная боль в животе <p>Симптомы, свидетельствующие о синдроме лизиса</p> <ul style="list-style-type: none"> > Окрашивание мочи > Уменьшение количества выделяемой мочи > Боль в боку под ребрами
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми,...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Вес	При расстройствах пищеварения или удержании воды регулярно проверяйте свой вес .
Уход за кожей	Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей



Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Удержание воды (отёчность конечностей)	Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Кладите ноги в возвышенное положение. Регулярно проверяйте свой вес.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Удержание воды	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием соли.

