



SUNITINIB MALATE - SUTENT®

რა არის SUTENT-ი

მოლეკულის აღწერა	აღწერა
სუნიტინიბი	12,5 მგ კაფსულა: წითელი 25 მგ კაფსულა: ნარინჯისფერი და წითელი 50 მგ კაფსულა: ნარინჯისფერი 

როგორ უნდა მიიღოთ წამალი?

წამლის დოზირება განსაზღვრულია თქვენი ექიმის მიერ.

თქვენს შემთხვევაში, არის მგ/დღეში, ანუ 12,5 მგ-ანი კაფსულა, 25 მგ
ანი კაფსულა და/ან 50 მგ-ანი კაფსულა, რომელიც მიიღება დღეში ერთხელ.

(მიუთითეთ, უწყვეტლივ მიიღება თუ არა).

გადაყლაპეთ მთლიანად, ერთ ჭიქა წყალთან, გახსნის ან განზავების

გარეშე. მიიღება ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეშე.

დავინყების ან ღებინების შემთხვევაში: არ მიიღოთ დამატებითი დოზა, დაელოდეთ შემდეგ მიღებას.

დოზირება - მიღების წესი

ერთხელ დღეში, ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეთ								
უწყვეტლივ	 დ1	 დ2	 დ3	 დ4	 დ5	 დ6	 დ7	 დ28
1-დან 28-ე დღემდე, ყოველ 6 კვირაში	 დ1	 დ28	 დ29	 ...	 დ42			

როგორ მოიქცეთ, რომ არ გამოგელიოთ მარაგი?

ეს წამალი ხელმისაწვდომია ქალაქის აფთიაქებში.

მის მიწოდება შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო. ყურადღებით იყავით და წინასწარ დაგეგმეთ თქვენი
რეცეპტის განახლება.

შეინახეთ ეს წამალი ორიგინალ შეფუთვაში, სითბოსა და ტენიანობისგან დაცულ ადგილას.

სხვა რა ინფორმაცია უნდა იცოდეთ?

გამაფრთხილებელი ზომები და მეთვალყურეობა

თქვენი მედიკამენტის მიღება საჭიროებს ბიოლოგიურ მეთვალყურეობას (სისხლის საერთო ანალიზი, რომელიც საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ სისხლის მაჩვენებლებს, ღვიძლის, პანკრეასის და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციებს და შარდში ცილების დონეს) და კლინიკურ მეთვალყურეობას (არტერიული წნევა, ელექტროკარდიოგრამა, გულის სცინტიგრაფია).

კონტრაცეფცია

ეს წამალი შეიძლება ზიანს აყენებდეს ჩანასახს. თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მისი შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ ეფექტური კონტრაცეპტული მეთოდები (პრეზერვატივი და დამატებითი მეთოდი).

მედიკამენტებთან და/ან კვებასთან ურთიერთქმედება

SUTENT®-ის სხვა პრეპარატებთან ერთად მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ეფექტები (პრეპარატის ეფექტურობისა და ამტანობის შემცირება). ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ფარმაცევტი და

მკურნალი ექიმი ინფორმირებული იყვნენ ყველა იმ მედიკამენტის და/ან სხვა ნივთიერებების (საკვები პროდუქტები, მცენარეები, პრობიოტიკები, ეთერზეთები დანამატები და სხვ.) შესახებ, რომელსაც იღებთ მაგალითი: მოერიდეთ კრაზანას, გრეიფრუტის წვენის, გინკგო ბილობას, სევილიური ფორთოხლის, თაგვისარას, ძირტკბილას, იოჰიმბეს მიღებას SUTENT®-თან ერთად.

რომელია არასასურველი გვერდითი მოვლენები?

ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენები ჩამოთვლილია ქვემოთ. ასევე შესაძლოა სხვა გვერდითი ეფექტებიც გამოვლინდეს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით მედიკამენტის ინსტრუქციას ან მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი მოვლენები	
ყველაზე ხშირი	საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევები: მადის დაკარგვა, გემოს დარღვევა, დიარეა, გულისრევა, პირის ღრუს ანთება (პირის ღრუს წყლულები), მუავა რეფლუქსი, ღებინება გულის ფუნქციის დარღვევები: მათ შორის ჰიპერტენზია კანის დარღვევები: კანის და/ან თმის ფერის შეცვლა, ხელი-ფეხის სინდრომის, გამონაყარი, სიმშრალე ბიოლოგიური ანალიზების ანომალიები: ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევები (ჰიპოთირეოზი), ნეიტროფილების პოლინუკლეარული უჭრელების შემცირება (ნეიტროპენია), თრომბოციტების (თრომბოციტოპენია), ჰემოგლობინის (ანემია), ჰიპოგლიკემია ტკივილი: ხელები, ფეხები, სახსრები, თავის ტკივილი თვალის პრობლემები: ცრემლდენა, შეშუპება (შეშუპება) ინფექციები სხვა: დაღლილობა, ძილის დარღვევა, მხედველობის დაბინდვა
ზოგ პაციენტს ესაჩიროება განსაკუთრებული ყურადღება	დიაბეტის მატარებელი პაციენტები (ჰიპოგლიკემია)
როდის უნდა მიმართოთ სამედიცინო გუნდს?	
გააფრთხილეთ სამედიცინო გუნდი შემდეგ შემთხვევებში, თუ არ გაქვთ მიღებული კონკრეტული სამედიცინო რეკომენდაციები	მომნელებელი სისტემის დარღვევები > წონის სწრაფი და/ან მნიშვნელოვანი კარგვა > ძალიან ხშირი დიარეა, დღეში 4-ზე მეტჯერ კუჭში გასვლა > პირის ღრუს ტკივილი ან წყლულები, რომლებიც ხელს უშლის ნორმალურ კვებას > ინტენსიური ტკივილი მუცლის არეში > 24 საათის განმავლობაში დაღევის და/ან დაახლოებით 48 საათის განმავლობაში ჭამის შეუძლებლობა. ინფექციის მაჩვენებელი სიმპტომები > თავის ტკივილი, ყურებში ზუზუნი და/ან თავბრუსხვევა > დასაშვები ციფრების ზრდა არტერიული წნევის გაზომვისას სისხლდენის მაჩვენებელი სიმპტომები > სისხლი განავალში, ან ღებინების დროს > სისხლჩაქვებები (სილურჯეები), ცხვირიდან სისხლდენა ინფექციის მაჩვენებელი სიმპტომები > ტემპერატურა > 38,5 °C > ხველება, ყელის ტკივილი, ტკივილი შრდვისას, დიარეა და სიცხე ერთად ტკივილები, რომელიც ხელს გიშლით ჩვეულ აქტივობებში > თავის ტკივილები > სახსრების ტკივილი გულის პრობლემის მაჩვენებელი სიმპტომები > სუნთქვის უკმარისობა, გულის ფრიალი, წნეხი გულმკერდის არეში ჰიპოგლიკემიის სიმპტომები > თავბრუსხვევა, გულისრევა, მხედველობის დაბინდვა, კუნთების სისუსტე ფლებიტზე მიმანიშნებელი სიმპტომები > შეწითლება წვივის არეში, ტკივილი და შეხურება
როგორ უნდა მოახდინოთ გვერდითი მოვლენების პრევენცია?	
არტერიული წნევის მარეგულირებელი	მაღალი წნევა უნდა გამოსწორდეს. არტერიული წნევის რეგულარული გაზომვა რეკომენდირებულია. ფარმაცევტებს შეუძლიათ დაგეხმარონ წნევის გაზომვაში. შეგიძლიათ სთხოვოთ, რომ თქვენ თვითონ გაიზომოთ ავტო-წნევის გაზომვით.

წონა	გააკონტროლეთ რეგულარულად თქვენი წონა კუჭ-ნაწლავის დარღვევების დროს
სტომატოლოგიური ჰიგიენა	გამოიყენეთ რბილი კბილის ჯაგრისი და გამოიყენეთ პირის ღრუს სავლები ნატრიუმის ბიკარბონატით. მოერიდეთ მენტოლის ან ალკოჰოლის შემცველ პირის ღრუს სავლებს.
კანის მოვლა	ხელებსა და ფეხებზე: წაისვით ხელებსა და ფეხებზე დამატენიანებელი კრემი ან რძე და/ან შემახორცებელი კრემი (ძლიერი შეზღუდვის გარეშე). მოერიდეთ ხელებისა და ფეხების სიცხესთან (ცხელ წყალთან) შეხებას. მოერიდეთ ხახუნის ან წყლულების გამომწვევ აქტივობებს და მოერიდეთ მჭიდრო ტანსაცმლის, წინდებისა და ფეხსაცმლის ტარებას. სხეული: უპირატესობა მიანიჭეთ რბილ საპონს და დამატენიანებელ კრემს, გაიშრეთ ტამპონირებით. მოერიდეთ ნებისმიერი გამაღიზიანებელი საშუალების გამოყენებას. მზისგან თავის დასაცავად გამოიყენეთ მზისგან დამცავი კრემი და მოერიდეთ მზის სხივების ზემოქმედებას.
დაღლილობა	ამჯობინეთ ისეთი აქტივობები, რომლებიც თქვენს კარგად ყოფნას უწყობს ხელს, განსაკუთრებით კი ადაპტირებული და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა: სიარული, ცურვა, ველოსიპედით სიარული, სპორტი და ა.შ. ჩაანაცვლეთ აქტივობის პერიოდი დასვენებით და პირიქით.
სისხლდენა / სისხლჩაქცევები	მოერიდეთ ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების (იბუპროფენი, ასპირინი და ა.შ.) მიღებას აცნობეთ თქვენს ექიმს: > თუ იღებთ ანტიკოაგულანტებს ან თრომბოციტების ანთიაგრეგანტულ პრეპარატებს: საჭიროა მკაცრი მონიტორინგი > ქირურგიული ან სტომატოლოგიური ჩარევის შემთხვევაში
ინფექცია	რეკომენდირებულია პნევმოკოკისა და გრიპის საწინააღმდეგო აცრა : ის თქვენ დაგიცავთ.
როგორ უნდა დაიწყოთ ადაპტირებული კვება?	
მადის დაკარგვა	უპირატესობა მიანიჭეთ უფრო კალორიულ საკვებს და და „გემრიელ კვებას“.
გემოს შეგრძნების დარღვევები	მიიღეთ თბილი ან ცივი საკვები პატარა რაციონით რამდენჯერმე დღეში. მოერიდეთ სამზარეულოს მეტალის ქურჭელს.
ღიარეა	უპირატესობა მიანიჭეთ დაბალ ბოჭკოვან დიეტას. სასურველია. მიირთვათ სახამებლიანი პროდუქტები, სტაფილო და ბანანი. არ მიირთვათ უმი ხილი და ბოსტნეული, რძის პროდუქტები, ყავა და ალკოჰოლი. დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით.
გულის რევის შეგრძნება	უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაგმენტულ კვებას, რომელიც გადანაწილებულია რამდენიმე მსუბუქ რაციონად. საკვები უნდა იყოს თხევადი და ცივი. შეზღუდეთ ცხიმოვანი, შემწვარი და ცხარე საკვები.
პირის ღრუს ანთება (წყლულები)	მოერიდეთ მჟავე ან ნებოვანი საკვების მიღებას და ძალიან მარილიან საკვებს.
მჟავა რეფლუქსი	მოერიდეთ ალკოჰოლის, თამბაქოს, ყავის, დიდი რაოდენობით ცხიმოვანი და შემწვარი საკვების მოხმარებას. უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაქციულ კვებას.