



Что такое Алунбриг®

Название препарата	Описание
Бригатиниб	Таблетка 90 мг: белая, овальная Таблетка 180 мг: белая, овальная

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. таблетку(ок).....мг, 1 раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки

В установленное время, во время еды или вне еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в установленное время, во время еды или без еды									
Без перерыва									
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	...	Д28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в аптеках по месту жительства.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните это средство в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, уровня глюкозы крови, креатинфосфокиназы и функции печени, почек и поджелудочной железы), а также мониторинг клинического состояния.

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между Алунбригом® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме Алунбрига® следует избегать употребления сока грейпфрута, зверобоя и некоторых добавок, которые могут способствовать гипертензии, таких как гинкго, померанец, иглица колючая, солодка, йохимбе.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены только наиболее распространённые побочные явления. Возможны и другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
Самые распространённые	<p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: отклонение в результатах исследований функции печени и (или) поджелудочной железы, повышенный уровень сахара в крови и (или) креатинфосфокиназы, низкий уровень гемоглобина (анемия), лейкоцитов (лейкопения)</p> <p>Нарушения пищеварения: тошнота, рвота, диарея, запор, воспаления во рту (язвы)</p> <p>Проблемы с кожей: сыпь, чувствительность к солнцу</p> <p>Респираторные заболевания: кашель, затруднённое дыхание</p> <p>Проблемы, относящиеся к сердечно-сосудистой системе: артериальная гипертензия, нарушения функции сердца</p> <p>Боли: головные боли, мышечная боль (миалгия)</p> <p>Нейропатия: нарушения чувствительности (онемение, покалывание, ощущение мурашек по телу), ощущение жжения или удара током, боль при холоде, при жаре и при изменении температуры</p> <p>Прочее: усталость, расстройства сна, нарушения зрения</p>



Некоторые пациенты требуют особого внимания	Больные сахарным диабетом (гипергликемия) Пациенты с непереносимостью лактозы
О ЧЁМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Респираторные заболевания</p> <ul style="list-style-type: none"> > Постоянный усиливающийся кашель или трудности с дыханием <p>Симптомы, свидетельствующие о гипертонии</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли, шум в ушах и (или) головокружение > Увеличение показателей артериального давления <p>Симптомы, свидетельствующие об замедлении сердечного ритма (брадикардии)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Потеря сознания, головокружение > Снижение артериального давления <p>Нарушения пищеварения</p> <ul style="list-style-type: none"> > Существенная и (или) быстрая потеря веса > Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки > Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи > Сильная боль в животе > Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов > Стул реже 3 раз в неделю <p>Проблемы с глазами</p> <ul style="list-style-type: none"> > Боль в глазах, слезотечение или покраснение, нечёткость зрения или чувствительность к свету <p>Боль, мешающая Вам заниматься своей обычной деятельностью</p> <ul style="list-style-type: none"> > Головные боли > Мышечная боль > Нарушения чувствительности
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ?	
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать высокое давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес .
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Уход за кожей	Делайте выбор в пользу мягкого мыла и увлажняющего средства, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу.
Защита от солнца	Наносите крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра (SPF 50) и избегайте солнечного воздействия. Делайте выбор в пользу закрывающей одежды с длинными рукавами и с воротником, длинных брюк и шляп.
Глаза	Избегайте носить контактные линзы. Избегайте водить машину при слабой освещённости.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Инфекция	Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
КАК АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ ДИЕТУ?	
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте побольше воды.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте побольше воды.
Воспаление во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.

