



فينيتوكلاكس - فينكليكستو® VENETOCLAX - VENCLYXTO

ما هو دواء فينكليكستو

وصف	وصف الجزيء
<p>قرص 10 ملغ: دائري، أصفر قرص 50 ملغ: بيضاوي، بيج قرص 100 ملغ: بيضاوي، أصفر فاتح</p> 	فينيتوكلاكس

كيف يُتناول هذا الدواء؟

تُحدّد جرعة علاجك من قبل طبيبك.
في حالتك، تقدر الجرعة ب ملغ في اليوم، أي قرص (أقرص)..... ملغ، يتم تناولها مرّة (1) في اليوم، يوميًا.
البداية بزيادة الجرعة على مدار أسبوع (من إلى ملغ، مع مضاعفة الجرعة كل أسبوع).
>الأسبوع 1 ملغ/في اليوم
>الأسبوع 2 ملغ/في اليوم
>الأسبوع 3 ملغ/في اليوم
>الأسبوع 4 ملغ/في اليوم
>ابتداءً من الأسبوع 5 ملغ/في اليوم
خلال مرحلة المعايرة، اشرب 1,5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا
تُبَلع الأقرص كاملةً مع كوب من الماء، دون سحقها أو مضغها أو تقطيعها.
تؤخذ في وقت محدد، أثناء تناول الوجبة.
في حالة النسيان أو التقيو: لا تأخذ جرعة إضافية، بل انتظر الجرعة التالية.

الجرعة - كيفية تناول الدواء

  	جرعة واحدة في اليوم، أثناء تناول الوجبات						
       	بشكل مستمر						
اليوم 28	اليوم 7	اليوم 6	اليوم 5	اليوم 3	اليوم 2	اليوم 1	4

كيفية التحكم في مخزون العلاج الخاص بك؟

هذا الدواء متوفر في صيدليات المدينة.
وقد يتطلب توفيره بعض الوقت. ينبغي الانتباه لهذا الأمر والقيام بإعادة تجديد الوصفة الطبية الخاصة بك مسبقاً.
يرجى حفظ هذا العلاج في عبوته الأصلية، بعيداً عن الحرارة والرطوبة.

ما هي المعلومات الأخرى التي يجب معرفتها؟

الاحتياطات والمراقبة
يقتضي تناول الدواء الخاص بك مراقبة بيولوجية (فحص دم لمراقبة تعداد الدّم الكامل ووظائف الكلى وتحليل كيمياء الدم).
منع الحمل

قد يكون هذا العلاج ضاراً للجنين. يجب عليك أنت وشريكك استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (واقي ذكري أو وسائل أخرى) طوال مدة العلاج ولمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى و/أو نظامك الغذائي

قد يكون للتفاعلات بين VENCLYXTO® وعلاجاتك الأخرى آثار ضارة (انخفاض فعالية الدواء وتحمله). من المهم إبلاغ الصيدلي والطبيب الخاصين بك بجميع الأدوية و/أو المواد الأخرى التي تستهلكها (الطعام والنباتات والبروبيوتيك والزيوت الأساسية والمكملات الغذائية وما إلى ذلك).
مثال: تجنب استهلاك نبتة سانت جون (عشبة القديس يوحنا)، المریمیة، الكركم، النعناع الفلفلي، زهرة العاطفة، الزعرور بجميع أشكاله (كبسولات، راتنج، شاي أعشاب، قطرات...) وكذلك الجريب فروت (عصير، لب)، البرتقال المر أو فاكهة الكارامبولا.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

تذكر أدناه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً. من المحتمل حدوث آثار جانبية أخرى. لمعرفة المزيد، ينبغي مراجعة نشرة الدواء الخاصة بك أو يرجى الرجوع إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على استشارة.

الآثار الجانبية	
<p>اضطرابات الجهاز الهضمي: الغثيان، التقيؤ، الإسهال، الإمساك، التهاب آلام البطن التعب</p> <p>اضطرابات بولية: التهابات المسالك البولية، بول داكن اللون، ارتفاع نسبة الكرياتينين</p> <p>اضطرابات رئوية: التهابات</p> <p>خلل في الفحص البيولوجي: انخفاض الهيموجلوبين (فقر الدم)، و/ أو في العدلات متعددة النوى (قلة العدلات)</p> <p>متلازمة انحلال الورم: ارتفاع في نسبة البوتاسيوم، الفوسفور، واليوريا (فرط بوتاسيوم الدم، فرط فوسفور الدم، فرط حمض اليوريك في الدم)</p> <p>انخفاض نسبة الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم)</p>	الأكثر شيوعاً
مرضى يتناولون مضادات فيتامين K (يُنصح بمراقبة دقيقة لمعدل النسبة المعيارية الدولية)	يحتاج بعض المرضى إلى مراقبة خاصة
متى يجب تنبيه الفريق الطبي؟	
<p>اضطرابات الجهاز الهضمي</p> <p>في حالة فقدان الوزن بشكل كبير و/أو سريع</p> <p>إسهال متكرر جداً، والتبرز أكثر من 4 مرات في اليوم</p> <p>ألم أو تقرحات في الفم تمنع اتباع نظام غذائي طبيعي</p> <p>آلام حادة في المعدة</p> <p>عدم القدرة على الشرب لمدة 24 ساعة و/أو تناول الطعام لمدة 48 ساعة تقريباً</p> <p>التبرز أقل من 3 مرات في الأسبوع</p> <p>أعراض تشير إلى العدوى</p> <p>درجة حرارة تفوق 38.5 درجة مئوية</p> <p>سعال، صعوبة التنفس، ألم في الحلق، ألم عند التبول، إسهال مع حمى</p> <p>أعراض الحساسية</p> <p>حكة مع طفح جلدي</p> <p>تورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحلق، مما يسبب صعوبة في البلع أو التنفس</p> <p>أعراض تشير إلى متلازمة انحلال الورم</p> <p>تلون البول</p> <p>انخفاض كمية التبول</p> <p>ألم في جانب واحد تحت الأضلاع</p>	تنبيه الفريق الطبي في الحالات التالية وفي حالة غياب توصيات طبية محددة
كيفية الوقاية من الآثار الجانبية؟	
تجنب الذهاب إلى الأماكن التي تُشكّل خطورة عليك (الحشود، والاحتكاك بالمرضى، وما إلى ذلك). قد يُوصى بالتطعيم ضد الأنفلونزا والمكورات الرئوية: من أجل الوقاية	العدوى
اسأل طبيبك قبل بدء العلاج عن طرق الحفاظ على السائل المنوي	العقم

الإمساك	لتحفيز حركة الأمعاء، مارس نشاط بدني ملائم ومنتظم: المشي والبستنة والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها
التعب	اختر الأنشطة التي توفر لك الراحة، وعلى وجه الخصوص، النشاط البدني الملائم والمنتظم: المشي والسباحة وركوب الدراجات والرياضة وغيرها احرص على التناوب بين فترة النشاط والراحة
العناية بالبشرة	للحماية من أشعة الشمس، استخدم كريم واقى من أشعة الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس
التعامل مع دواء مضاد للسرطان	تجنب ملامسة الكبسولات للجلد. ارتد قفازات واغسل يديك بعد الاستعمال
كيفية ضبط نظامك الغذائي؟	
الإسهال	انتق نظاماً غذائياً ذا نسبة قليلة من الألياف. ويفضل تناول النشويات والجزر والموز تجنب تناول الفواكه والخضروات النيئة ومنتجات الألبان والقهوة والكحول اشرب الكثير من الماء، إذا أمكن 2 لتر يومياً
الغثيان	انتق نظاماً غذائياً مقسماً إلى عدة وجبات خفيفة وأطعمة سائلة وباردة قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة
الإمساك	انتق نظاماً غذائياً غنياً بالألياف. اشرب الكثير من الماء