




SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE
ONCOLIEN®

პაციენტის საინფორმაციო ფურცელი



VISMODEGIB - ERIVEDGE®

რა არის ERIVEDGE

მოლეკულის აღწერა	აღწერა
ვისმოდეგიბი	150 მგ კაფსულა: ლურჯი და ვარდისფერი 

როგორ უნდა მიიღოთ წამალი?

წამლის დოზირება განსაზღვრულია თქვენი ექიმის მიერ.

თქვენს შემთხვევაში, არის მგ/დღეში, ანუ მგ-იანი კაფსულა, რომელიც უნდა მიიღოთ დღეში ერთხელ, ყოველდღე.

გადაყლაპეთ მთლიანად, ერთ ჭიქა წყალთან ერთად, კაფსულების გაშლის ან წყალში გახსნის გარეშე.

მიიღეთ ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეშე.

დავინწყების ან ღებინების შემთხვევაში: არ მიიღოთ დამატებითი დოზა, დაელოდეთ შემდეგ მიღებას.

დოზირება - მიღების წესი

1 მიღება 24 საათში, ფიქსირებულ დროს, კვებისას ან კვების გარეშე	  
უწყვეტლივ	       ...  დ1 დ2 დ3 დ4 დ5 დ6 დ7 ... დ28

როგორ მოიქცეთ, რომ არ გამოგელით მარაგი?

ეს წამალი ხელმისაწვდომია ქალაქის აფთიაქებში.

მის მიწოდებას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო. ყურადღებით იყავით და წინასწარ დაგეგმეთ თქვენი რეცეპტის განახლება.

შეინახეთ ეს წამალი ორიგინალ შეფუთვაში, სითბოსა და ტენიანობისგან დაცულ ადგილას.

სხვა რა ინფორმაცია უნდა იცოდეთ?

გამაფრთხილებელი ზომები და შეთვალყურეობა

თქვენი მედიკამენტის მიღება საჭიროებს ბიოლოგიურ მეთვალყურეობას (სისხლის საერთო ანალიზის აღება, რომელიც საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ სისხლის მაჩვენებლებს, ღვიძლისა და კუნთების ფუნქციებს) და კლინიკურ მეთვალყურეობას (ორსულობის ტესტები).

კონტრაცეფცია

ეს წამალი შეიძლება ზიანს აყენებდეს ჩანასახს. თქვენ და თქვენმა პარტნიორმა მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მისი შეწყვეტიდან ერთი თვის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ ეფექტური კონტრაცეპტული მეთოდები (პრეზერვატივი და სხვა მეთოდი).

მედიკამენტებთან და/ან კვებასთან ურთიერთქმედება

ERIVEDGE®-ის სხვა პრეპარატებთან ერთად მიღებამ შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ეფექტები (პრეპარატის ეფექტურობისა და ამტანობის შემცირება). ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ფარმაცევტი და მკურნალი ექიმი ინფორმირებული იყვნენ ყველა იმ მედიკამენტის და/ან სხვა ნივთიერებების (საკვები პროდუქტები, მცენარეები, პრობიოტიკები, ეთერზეთები, საკვები დანამატები და სხვ.) შესახებ, რომელსაც იღებთ

მაგალითი: მოერიდეთ კრაზანას ან ანტიოქსიდანტების მოხმარებას ERIVEDGE®-თან ერთად.

რომელია არასასურველი გვერდითი მოვლენები?



ყველაზე გავრცელებული გვერდითი მოვლენები ჩამოთვლილია ქვემოთ. ასევე შესაძლოა სხვა გვერდითი ეფექტებიც გამოვლინდეს. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით მედიკამენტის ინსტრუქციას ან მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

გვერდითი მოვლენები	
ყველაზე ხშირი	კუნთოვანი და ძვლოვანი სისტემის დარღვევები: კუნთების შეკუმშვა, სახსრებისა და კიდურების ტკივილი კანის დარღვევები: თმის ცვენა, ქავილი, გამონაყარი ჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევები: გემოს დარღვევა, წონის დაკლება, გულისრევა, დიარეა, მუავა რეფლუქსი, კუჭის შეკრულობა. დაღლილობა
ზოგ პაციენტს მკურნალობის დროს ესაჩიროება განსაკუთრებული ყურადღება	მშობიარობის ასაკის ქალებში (ორსულობა უკუნაჩვენებია, ტერატოგენულია, ნაყოფის მალფორმაციის რისკი) მამაკაცები (სქესობრივი კავშირის დროს აუცილებელია პრეზერვატივის გამოყენება)
როდის უნდა მიმართოთ სამედიცინო გუნდს?	
გააფრთხილეთ სამედიცინო გუნდი შემდეგ შემთხვევებში, თუ არ გაქვთ მიღებული კონკრეტული სამედიცინო რეკომენდაციები	ორსულობის ეჭვი მკურნალობაზე მყოფ ქალში მკურნალობაზე მყოფ მამაკაცის პარტნიორში კანის დარღვევები მეჭეჭების გამოჩენა მტკივნეული კანი ან კანზე მონითალო კოპი, რომელსაც თან ახლავს სისხლდენა ან არ შეხორცდება ხალის ზომის ან ფერის შეცვლა საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევები მნიშვნელოვანი და/ან სწრაფი წონის დაკლების შემთხვევაში ძალიან ხშირი დიარეა, დღეში 4-ზე მეტჯერ კუჭში გასვლა ინტენსიური ტკივილი მუცლის არეში. 24 საათის განმავლობაში დაღუპვის და/ან დაახლოებით 48 საათის განმავლობაში ჭამის შეუძლებლობა. კვირაში 3-ზე ნაკლები კუჭში გასვლა
როგორ უნდა მოახდინოთ გვერდითი მოვლენების პრევენცია?	
მშობიარობის ასაკის ქალებში	ორსულობა უკუნაჩვენებია , ნაყოფის მალფორმაციის რისკი. მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და ბოლო დოზის მიღებიდან 2 წლის განმავლობაში სქესობრივი კავშირის დროს გამოიყენეთ ჩასახვის სანინაალმდეგო ორი მეთოდი. ორსულობის ტესტი ჩაიტარეთ ყოველთვიურად და ბოლო დოზის მიღებიდან 2 წლის განმავლობაში.
მამაკაცებში	მკურნალობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და ბოლო დოზის მიღებიდან 2 თვის განმავლობაში სქესობრივი კავშირის დროს გამოიყენეთ პრეზერვატივი.
დაღლილობა	ამჟობინეთ ისეთი აქტივობები, რომლებიც თქვენს კარგად ყოფნას უწყობს ხელს, განსაკუთრებით კი ადაპტირებული და რეგულარული ფიზიკური აქტივობა: სიარული, ცურვა, ველოსიპედით სიარული, სპორტი და ა.შ. ჩაანაცვლეთ აქტივობის პერიოდი დასვენებით და პირიქით.
წონა	გააკონტროლეთ რეგულარულად თქვენი წონა კუჭ-ნაწლავის დარღვევების დროს.



კანის მოვლა	უპირატესობა მიანიჭეთ რბილ საპონს და დამატენიანებელ კრემს, გაიშრეთ ტამპონირებით. მოერიდეთ ნებისმიერი გამაღიზიანებელი საშუალების გამოყენებას. მზისგან თავის დასაცავად გამოიყენეთ მზისგან დამცავი კრემი და მოერიდეთ მზის სხივების ზემოქმედებას.
თმის ცვენა	გამოიყენეთ რბილი შამპუნი (ჩვილებისთვის განკუთვნილი) მცირე დოზით. უპირატესობა მიანიჭეთ რბილ კბილის ჭაგრისს. მოერიდეთ თმის ძალიან ხშირად დაბანას. მოერიდეთ სითბოს წყაროებს (ფენი, ცხელი ბიგუდები, თმის უთოები), თმის შეღებვას, მელირებას და ქიმიურ დახვევას.
როგორ უნდა დაინწყოთ ადაპტირებული კვება?	
გემოს შეგრძნების დარღვევები	უპირატესობა მიანიჭეთ თბილ ან ცივ საკვებს პატარა რაციონით რამდენჯერმე დღეში. მოერიდეთ სამზარეულოს მეტალის ჭურჭელს.

წონის დაკლება	უპირატესობა მიანიჭეთ უფრო კალორიულ საკვებს და „გემრიელი კვებას“.
გულის რევის შეგრძნება	უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაგმენტულ კვებას, რომელიც გადანაწილებულია რამდენიმე მსუბუქ რაციონად. საკვები უნდა იყოს თხევადი და ცივი. შეზღუდეთ ცხიმოვანი, შემწვარი და ცხარე საკვები.
დიარეა	უპირატესობა მიანიჭეთ დაბალ ბოჭკოვან დიეტას. სასურველია, მიირთვათ სახამებლიანი პროდუქტები, სტაფილო და ბანანი. მოერიდეთ უმ ხილს და ბოსტნეულს, რძის პროდუქტებს, ყავას და ალკოჰოლს. დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით.
კუჭის შეკრულობა	უპირატესობა მიანიჭეთ ბოჭკოვანით გამდიდრებულ დიეტას. დალიეთ წყალი დიდი რაოდენობით.
მჟავა რეფლუქსი	მოერიდეთ რისკის ფაქტორებს: ალკოჰოლს, თამბაქოს, ყავას, დიდი რაოდენობით და ცხიმოვან საკვებს. უპირატესობა მიანიჭეთ ფრაქციულ დიეტას.

