



АКАЛАБРУТИНІБ - КАЛКВЕНС®

Що таке КАЛКВЕНС

Назва препарату	Опис
Акалабрутиніб	Пігулки 100 мг: рожеві 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто... пігулок 100 мг 2 рази на день, щодня. Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не розжовуючи, не подрібнюючи, не розчиняючи та не розрізаючи пігулки.

Приймати в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу, її можна прийняти протягом 3 годин. Однак у разі блювання не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

2 рази на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі	  
Без перерви	

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для щотижневого моніторингу кількісних показників складу крові), а також моніторинг клінічного стану (електрокардіограма, спостереження у дерматолога).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи, протизаплідні пігулки у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між КАЛКВЕНСОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні КАЛКВЕНСА® слід уникати вживання звіробію та грейпфрута.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища	
Найбільш поширені	Інфекції: підвищена температура, респіраторні інфекції (фарингіт, ларингіт, синусит, риніт, пневмонія тощо) Біль: головний біль, біль у суглобах та м'язах, м'язові спазми Порушення травлення: діарея, нудота, блювання, закріп, запалення у роті (виразки), втрата апетиту Судинні порушення: незвичні кровотечі, плями на шкірі, гематоми, гіпертонія Загальні порушення: стомленість, набрякання ніг та (або) рук, запаморочення Проблеми зі шкірою: шкірний висип Відхилення в результатах лабораторних досліджень: зниження кількості багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія), зниження рівня гемоглобіну (анемія) та (чи) кількості тромбоцитів (тромбоцитопенія) Серцеві порушення
Пацієнти, які потребують особливої уваги	Пацієнти з порушенням серцевої функції Пацієнти, які перенесли гепатит В
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Симптоми, що свідчать про інфекцію Температура > 38,5 °C Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою Порушення травлення Суттєва та (або) швидка втрата ваги Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі Сильний біль у животі Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин Випорожнення рідше 3 разів на тиждень Погіршення захворювання шкіри: Біль або запалення в кистях рук та стопах Респіраторні проблеми Погіршення тривалого кашлю або утруднене дихання Симптоми, що свідчать про крововилив Кров у випорожненні чи у блювотних масах Гематоми (синці), носові кровотечі Симптоми, що свідчать про набряк мозку Головний біль, сплутаність свідомості, судоми Проблеми зі зором Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю Головний біль Біль у суглобах Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця Задишка, прискорене серцебиття, біль або почуття стиснення в грудях Проблеми зі шкірою Утворення бородавок Болюча шкіра або червонуватий горбок на шкірі, що супроводжується кровотечею або не загоюється Зміна розміру або кольору родимки
Як запобігти побічним явищам?	



Інфекція	Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить.
Догляд за шкірою	На кистях рук і стопах: Наносіть на кисті рук і стопи зволожуючий крем або лосьйон, і (або) загоючий крем (не втираючи сильно). Уникайте піддавати кисті рук і ступні дії високих температур (гарячої води). Уникайте видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. Уникайте носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття. Тіло: Використовуйте для умивання м'яке мило та зволожувальний засіб, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. Для захисту від сонця використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.
Вага	При розладах травлення або набряках (набряканнях ніг та [або] рук) регулярно перевіряйте свою вагу .
Кровотечі, крововиливи	Уникайте приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...) Повідомте свого лікаря: якщо Ви приймаєте <i>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти</i> : необхідний ретельний моніторинг; про випадки <i>хірургічного чи стоматологічного</i> втручання.
Гігієна порожнини рота	Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополаскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Набряки	Уникайте занадто тісного одягу, шкарпеток та взуття. Кладіть ноги у високе положення.
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск . Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Як адаптувати свою дієту?	
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Закріп	Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте багато води.
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Втрата ваги	Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».
Запалення у роті (виразки)	Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.
Набряки	Робіть вибір на користь дієти з низькою кількістю солі.

