



БИНИМЕНИИБ - МЕКТОВИ®

Что такое МЕКТОВИ

Название препарата	Описание
Биниметиниб	Таблетки от жёлтого до тёмно-жёлтого цвета, неделимые, с гравировкой в виде логотипа «А» с одной стороны и «15» с другой стороны. 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. таблеток 15 мг 2 раза в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

Принимать в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу, её можно принять в течение 6 часов. Однако в случае рвоты не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

2 раза в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Без перерыва	

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в местных аптеках.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови и функции печени), а также мониторинг клинического состояния (сердечная функция, наблюдение за артериальным давлением, наблюдение у дерматолога и у окулиста).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы, противозачаточные таблетки в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между МЕКТОВИ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные

1/3



Программа ONCOLIEN [Общества онкологической фармации Франции](https://oncolien.sfpo.com) предоставляется в распоряжение в соответствии с условиями [международной лицензии 4.0 «С указанием авторства — с сохранением условий»](https://oncolien.sfpo.com). Основано на работе <https://oncolien.sfpo.com>.

Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, можно получить на сайте <https://www.sfpo.com>.

последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме МЕКТОВИ® избегайте употребления зверобоя.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления	
Самые распространённые	Отклонения в количественных показателях формулы крови: низкое содержание многоядерных нейтрофилов (нейтропения) и тромбоцитов (тромбоцитопения), низкий уровень гемоглобина (анемия), низкий уровень электролитов, нарушение функции печени и почек Нарушения пищеварения: тошнота, диарея, запор, потеря аппетита, боль в животе Проблемы с кожей: сухость кожи, кожная сыпь, покраснения, зуд Нарушения сердечной функции: повышение артериального давления, риск кровотечения, увеличение частоты сердечных сокращений, тромбоз вен. Проблемы с глазами: нарушение зрения Боли в суставах и (или) мышцах: спазмы, мышечная боль Прочее: периферическая нейропатия, усталость, отёк конечностей, головная боль, бессонница, головокружение
О чём следует сообщать медицинскому персоналу?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Нарушения пищеварения Существенная и (или) быстрая потеря веса Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца Потеря сознания, одышка, учащённое сердцебиение Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии Кровь в стуле, гематомы (синяки), носовые кровотечения Боли, мешающие Вашим обычным занятиям
Как предотвратить побочные явления?	
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми...). Вам может быть рекомендована вакцинация от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Уход за кожей	Используйте для умывания мягкое мыло и увлажняющее средство, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Вес	При расстройствах пищеварения, потере аппетита или отёках регулярно проверяйте свой вес .
Глаза	Избегайте носить контактные линзы. Избегайте водить машину в условиях слабой освещённости.
Боль в мышцах / суставах	Не забывайте хорошо увлажнять организм до, во время и после физической нагрузки. Занимайтесь подобранной и регулярной физической нагрузкой, предварительно разогревайтесь. Избегайте повторяющихся движений и чрезмерных физических усилий.

Кровотечения	Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: > о приёме <i>антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов</i> : необходим тщательный мониторинг; > о случаях <i>хирургического или стоматологического вмешательства</i> .
Выпадение или изменение текстуры волос	Используйте небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). Делайте выбор в пользу мягкой щётки. Избегайте слишком частого мытья волос. Избегайте источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки.
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра. Ограничьте потребление соли.
Как адаптировать свою диету?	
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Потеря аппетита	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте много воды.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте много воды.