



БУСУЛЬФАН - МАЙЛЕРАН®

Что такое МАЙЛЕРАН

Название препарата	Описание
Бусульфан	Таблетка 2 мг: белая, круглая 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. таблеток в день, принимать за один приём, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая и не растворяя таблетки.

Принимать один раз в день, в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Лейкемия: непрерывное ИЛИ последовательное лечение	
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток	 J1  J2  J3  J4

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в местных аптеках.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функций печени и почек).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции.

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между МАЙЛЕРАНОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему

фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.
Пример: При приёме Майлерана® избегайте принимать парацетамол, глутатион и препараты для очищения печени.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления	
Самые распространённые	Отклонения в результатах лабораторных исследований: низкое содержание тромбоцитов (тромбоцитопения), низкий уровень гемоглобина (анемия), отклонение от нормы печёночных проб, или проб щитовидной железы, снижение уровня калия или магния Нарушения пищеварения: диарея, тошнота, потеря аппетита, изменение вкуса, воспаление во рту (язвы), рвота, потеря веса, запор, кислотный рефлюкс Респираторные заболевания: кашель или усиление кашля
О чём следует сообщать медицинскому персоналу?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Нарушения пищеварения Существенная и (или) быстрая потеря веса Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи Сильная боль в животе Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов Стул реже 3 раз в неделю Ухудшение кожного заболевания: Боль или воспаление в кистях рук и стопах Симптомы, свидетельствующие об инфекции Температура > 38,5 °C Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой Респираторные заболевания Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии Кровь в стуле или в рвотных массах Гематомы (синяки), носовые кровотечения Симптомы, свидетельствующие об отёке мозга Головные боли, спутанность сознания, судороги Проблемы со зрением Боли, мешающие Вашим обычным занятиям Головные боли Боли в суставах
Как предотвратить побочные явления?	
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми...). Вам может быть рекомендована вакцинация от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Кровотечения, кровоизлияния	Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: о приёме <i>антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов</i>: необходим тщательный мониторинг; о случаях <i>хирургического или стоматологического вмешательства</i>.



Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Выпадение волос	Используйте небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). Делайте выбор в пользу мягкой щётки. Избегайте слишком частого мытья волос. Избегайте источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки.
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Кашель, одышка	Наблюдение за кашлем и одышкой, консультация с врачом при усилении симптомов

Как адаптировать свою диету?

Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Воспаление во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте много воды.

