



## БУСУЛЬФАН - МАЙЛЕРАН®

### Що таке МАЙЛЕРАН

| Назва препарату | Опис                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бусульфан       | Пігулка 2 мг: біла, кругла<br> |

### Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: ..... мг/день, тобто ..... пігулок на день, приймати за один прийом, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи та не розчиняючи пігулки.

Приймати один раз на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

### Дозування – схема приймання

|                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Один раз на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі |  |  |  |
| Лейкемія: безперервне ЧИ послідовне лікування               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин             |  |  |  |
|                                                             | J1                                                                                  | J2                                                                                   | J3 J4                                                                                 |

### Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

### Що ще треба знати?

#### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові, а також функції печінки та нирок).

#### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції.

#### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між МАЙЛЕРАНОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо),

1/3

Програма ONCOLIEN Товариства онкологічної фармації Франції надається у розпорядження відповідно до умов міжнародної ліцензії 4.0 «Із зазначенням авторства — із збереженням умов». Базується на роботі <https://oncolien.sfpo.com>. Дозволи, що виходять за рамки цієї ліцензії, можна отримати на сайті <https://www.sfpo.com>.

Товариство онкологічної фармації Франції – Інформаційний листок для пацієнтів, які отримують хіміотерапію



яких Ви вживаєте.  
Приклад: При прийманні Майлерану® уникайте прийому парацетамолу, глутатіону та препаратів для очищення печінки.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

| Побічні явища                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найбільш поширені                                                                                                     | <b>Відхилення в результатах лабораторних досліджень:</b><br>зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенія) чи рівня гемоглобіну (анемія), проблеми з функціонуванням печінки чи щитовидної залози, зниження рівня калію або магнію<br><b>Порушення травлення:</b> діарея, нудота, потеря апетита, зміна смаку, запалення у роті (виразки), блювота, втрата ваги, закріп, кислотний рефлюкс<br><b>Респіраторні захворювання,</b> кашель чи посилення кашлю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Про що слід повідомляти медичному персоналу?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій | <b>Порушення травлення</b><br>Суттєва та (або) швидка втрата ваги<br>Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу<br>Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі<br>Сильний біль у животі<br>Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин<br>Випорожнення рідше 3 разів на тиждень<br><b>Погіршення шкірного захворювання</b><br>Біль або запалення в кистях рук та стопах<br><b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b><br>Температура > 38,5 °C<br>Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою<br><b>Респіраторні захворювання:</b><br>Постійний посилюючий кашель чи утруднене дихання<br><b>Симптоми, що свідчать про крововилив</b><br>Кров у випорожненні чи у блювотних масах<br>Гематоми (синці), носові кровотечі<br><b>Симптоми, що свідчать про набряк мозку</b><br>Головні болі, сплутаність свідомості, судоми<br>Проблеми з зором<br><b>Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю</b><br>Головний біль<br>Біль у суглобах |
| Як запобігти побічним явищам?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Інфекція                                                                                                              | <b>Уникайте</b> відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кровотечі, крововиливи                                                                                                | <b>Уникайте</b> приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...)<br><b>Повідомте</b> свого лікаря:<br>якщо ви приймаєте <i>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти</i> : необхідний ретельний моніторинг про випадки <i>хірургічного чи стоматологічного</i> втручання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Втомлюваність                                                                                                         | <b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підібраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Випадання волосся                | <b>Використовуйте</b> невелику кількість м'якого шампуню (для немовлят). <b>Робіть вибір на користь</b> м'якої щітки. <b>Уникайте</b> занадто частого миття волосся. <b>Уникайте</b> джерел тепла (фена, нагрітих бігуді, гарячого утюжка), барвників, мелірування та хімічної завивки. |
| Гігієна порожнини рота           | <b>Використовуйте</b> м'яку зубну щітку, <b>використовуйте</b> ополаскувачі для рота, що містять питну соду. <b>Уникайте</b> ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.                                                                                                       |
| Кашель, задишка                  | Спостереження за кашлем і задишкою, звернення до лікаря при погіршенні симптомів                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Як адаптувати свою дієту?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Нудота                           | <b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.                                                                                                                  |
| Запалення у роті (виразки)       | <b>Уникайте</b> вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.                                                                                                                                                                                                                           |
| Діарея                           | <b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще <b>вживати</b> продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.                             |

