




## Що таке КАБОМЕТІКС®

Назва препарату	Опис
Кабозантіб	<p>Пігулка 20 мг: кругла, жовта Пігулка 40 мг: трикутній, жовта Пігулка 60 мг: овальна, жовта</p> 

## Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.












У Вашому випадку дозування таке: ..... мг/день, тобто ..... пігулок ..... мг один раз на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

У встановлений час. З проміжком часу між прийомом ліків та прийомом їжі (за 1 годину перед їжею чи через 2 години після їжі).

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

## Дозування – схема приймання

Один раз на день, у встановлений час, поза їжею		< 1 год — 2 год >		< 1 год — 2 год >		< 1 год — 2 год >		
Без перерви								
	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5	Д6	Д7	Д28

## Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в аптеках за місцем проживання.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь. Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

## Що ще треба знати?

### Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників формули крові, функції печінки, нирок, підшлункової залози та щитовидної залози, глюкози крові, жирів; аналіз сечі на визначення білка з використанням тест-смужок), а також моніторинг клінічного стану (артеріальний тиск, електрокардіограма).

### Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

### Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між КАБОМЕТІКСОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні КАБОМЕТІКСУ® не вживайте звиробой та уникайте вживання грейпфруту.

## Які є можливі побічні явища?

**Нижче перелічені лише найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.**

### ПОБІЧНІ ЯВИЩА



Найбільш поширені	<p><b>Порушення травлення:</b> діарея, нудота, втрата апетиту, порушення смакового сприйняття, запалення в роті (виразки), блювота, втрата ваги, закріп, кислотний рефлюкс</p> <p><b>Проблеми зі шкірою:</b> запалення долонь, підощв ніг та ділянок тертя (долонно-підощвовний синдром)</p> <p><b>Відхилення у результатах аналізу крові:</b> низька кількість тромбоцитів (тромбоцитопенія) чи низький рівень гемоглобіну (анемія), відхилення від норми функціональних проб печінки та щитовидної залози, низький рівень калію чи магнію</p> <p><b>Інші:</b> гіпертонія, стомленість, кровотечі, набряк кінцівок, кашель, зміна голосу</p>
Деякі пацієнти потребують особливої уваги	Гіпер- або гіпоглікемія у пацієнтів з діабетом
<b>ПРО ЩО СЛІД ПОВІДОМЛЯТИ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ?</b>	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	<p><b>Симптоми, що свідчать про гіпертонію:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Головні болі, шум у вухах та (або) запаморочення</li> <li>&gt; Збільшення показників артеріального тиску</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Задишка, прискорене серцебиття, біль або стиснення в грудях</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про крововилив чи флєбіт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Кров у випорожненні чи у блювотних масах</li> <li>Гематоми (синці), носові кровотечі</li> <li>&gt; Червона, гаряча та болісна ікра</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про інфекцію</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Температура &gt; 38,5 °C</li> </ul> <p><b>Порушення травлення</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Суттєва та (або) швидка втрата ваги</li> <li>&gt; Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу</li> <li>&gt; Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі</li> <li>&gt; Сильний біль у животі</li> <li>&gt; Виділення, нарив або біль у задньому проході</li> </ul> <p><b>Симптом порушення рівня глюкози крові</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <i>Гіперглікемія:</i> значні та часті позиви пити, їсти і мочитися, у поєднанні зі втомою</li> <li>&gt; <i>Гіпоглікемія:</i> запаморочення, нудота, проблеми з зором, м'язова слабкість</li> </ul> <p><b>Симптоми, що свідчать про набряк мозку:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Головний біль, сплутаність свідомості, судоми або проблеми зі зором</li> </ul>
<b>ЯК ЗАПОБІГТИ ПОБІЧНИМ ЯВИЩАМ?</b>	
Інфекція	Вам може бути <b>рекомендовано щеплення</b> від грипу та від пневмококової інфекції: воно вас захистить
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується <b>регулярно вимірювати артеріальний тиск</b> . Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Гігієна порожнини рота	<b>Використовуйте</b> м'яку зубну щітку, <b>використовуйте</b> ополаскувачі для рота, що містять питну соду. <b>Уникайте</b> ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Догляд за шкірою	<b>На кистях рук і стопах:</b> Нанесіть зволожуючий крем або молочко, і (або) загоючий крем на кисті рук і стопи (не втираючи сильно). <b>Уникайте</b> піддавати кисті рук і стопи дії високих температур (гарячої води). <b>Уникайте</b> видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. <b>Уникайте</b> носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття. <b>Тіло:</b> <b>Робіть вибір на користь</b> м'якого мила та зволожувального засобу, підсушуйте шкіру промоканням. <b>Уникайте</b> використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <b>Для захисту від сонця використовуйте</b> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та <b>уникайте</b> впливу сонячних променів.
Стомленість	<b>Робіть вибір на користь</b> занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... <b>Чергуйте</b> періоди активності та відпочинку.
Набряки кінцівок	<b>Уникайте</b> занадто тісного одягу, шкарпеток та взуття. <b>Кладіть</b> ноги у високе положення.
Вага	При розладах травлення або набряках кінцівок регулярно <b>перевіряйте</b> свою вагу.
<b>ЯК АДАПТУВАТИ СВОЮ ДІЄТУ?</b>	
Діарея	<b>Робіть вибір на користь</b> дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль моркву, банани. <b>Уникайте</b> вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. <b>Пийте</b> більше води.
Нудота	<b>Робіть вибір на користь</b> дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. <b>Обмежте</b> споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Втрата апетиту	<b>Робіть вибір на користь</b> більш калорійної дієти та «дієти задоволення».
Запалення у роті (виразки)	<b>Уникайте</b> вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.
Порушення смакового сприйняття	<b>Робіть вибір на користь</b> кількох невеликих прийомів теплої та холодної їжі на день. <b>Уникайте</b> вживання металевого кухонного приладдя.

