



ДАРЛУТАМИД - НУБЕКА®

Что такое НУБЕКА

Название препарата	Описание
Даролутамид	16 mm de long sur 8 mm de l Овальная таблетка белого или почти белого цвета, 16 x 8 мм  

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова:..... мг/день, т.е. таблеток ... мг 2 раза в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая и не растворяя таблетки.

Принимать в одно и то же время, с едой.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

2 раза в день, в одно и то же время, с едой	  
Без перерыва	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7   J28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в местных аптеках.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции почек и печени).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между НУБЕКОЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.



Пример: Избегайте употребления зверобоя и грейпфрутового сока.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления	
Самые распространённые	Отклонения в результатах лабораторных исследований: нейтропения Отклонение от нормы печеночных проб: повышение АсАТ, АлАТ, билирубина Общие проблемы: усталость, астения Проблемы с кожей: кожная сыпь Нарушения работы сердца: повышенное артериальное давление
О чём следует сообщать медицинскому персоналу?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Симптомы, свидетельствующие о гипертонии Головные боли, шум в ушах и (или) головокружения Увеличение показателей артериального давления Симптомы, свидетельствующие об инфекции Температура > 38,5 °C Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди Отечность ног (отёки)
Как предотвратить побочные явления?	
Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми...). Вам может быть рекомендована прививка от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление . Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Уход за кожей	Используйте для умывания мягкое мыло и увлажняющее средство, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Потеря веса	На протяжении лечения следите за своим весом: возможна потеря веса.

