



ДАРЛУТАМІД - НУБЕКА®

Що таке НУБЕКА

Назва препарату	Опис
Даролутамід	16 mm de long sur 8 mm de l Овальна пігулка білого або майже білого кольору, 16 x 8 мм 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто... пігулок мг, 2 рази на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи та не розчиняючи пігулки.

Приймати в один і той самий час, з їжею.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

Приймати 2 рази на день, в один і той самий час, з їжею	  											
Без перерви								...		J1	J2	J28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові, а також функції нирок та печінки).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між НУБЕКОЮ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.



Приклад: Уникайте вживання звиробу та грейпфрутового соку.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища	
Найбільш поширені	Відхилення у результатах лабораторних досліджень: нейтропенія Відхилення від норми функціональних проб печінки: підвищені АсАТ, АлАТ, білірубін Загальні розлади: стомленість, астенія Проблеми зі шкірою: шкірний висип Порушення роботи серця: підвищений артеріальний тиск
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Симптоми, що свідчать про гіпертонію Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення Збільшення показників артеріального тиску Симптоми, що свідчать про інфекцію Температура > 38,5 °C Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця Задихка, прискорене серцебиття, біль або стиснення в грудях Набряклість ніг (набряки)
Як запобігти побічним явищам?	
Інфекція	Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми, ...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить.
Контроль за тиском	Необхідно відкоригувати підвищений тиск. Рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск. Фармацевти можуть допомогти Вам виміряти тиск. Ви також можете попросити зробити це самостійно за допомогою автоматичного тонометра.
Догляд за шкірою	Використовуйте для умивання м'яке мило та зволожувальний засіб, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. Для захисту від сонця використовуйте крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Втрата ваги	Протягом лікування слідкуйте за своєю вагою: можлива втрата ваги.