



## ЭНАСИДЕНИБ - АЙДИФА®

### Что такое АЙДИФА

Название препарата	Описание
Энаседениб	Таблетки дозировкой 100 мг и 50 мг

### Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: ..... мг/день, т.е. .... таблеток ..... мг, принимать за один приём, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

Принимать в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу, её можно принять в течение 12 часов. В случае рвоты сразу после приёма примите новую дозу.

### Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Без перерыва	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

### Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в больничной аптеке.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

### Что ещё нужно знать?

#### Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции печени и почек, уровня калия, мочевой кислоты, фосфора и кальция), а также мониторинг клинического состояния.

#### Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

#### Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между АЙДИФОЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме АЙДИФЫ® избегайте употребления сока грейпфрута, зверобоя и красного дрожжевого риса.

### Каковы возможные побочные явления?

**Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.**

#### Побочные явления

1/2



<p>Самые распространённые</p>	<p><b>Нарушения пищеварения:</b> диарея, тошнота, рвота, потеря аппетита, нарушение или потеря вкусового восприятия</p> <p><b>Отклонения в результатах анализа крови:</b> повышенный уровень лейкоцитов (лейкоцитоз), билирубина (гипербилирубинемия), снижение уровня кальция, калия и фосфора (гипокальциемия, гипокалиемия и гипофосфоремиа).</p> <p><b>Синдром лизиса опухоли:</b> повышение уровня калия, фосфора и мочевины (гиперкалиемия, гиперфосфатемия, гиперурикемия). Снижение уровня кальция (гипокальциемия).</p>
<p><b>О чём следует сообщать медицинскому персоналу?</b></p>	
<p>Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций</p>	<p><b>Нарушения пищеварения</b>                  Существенная и (или) быстрая потеря веса                  Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки                  Сильная боль в животе</p> <p><b>Симптомы, указывающие на повышение уровня белых кровяных телец</b>                  Одышка, повышенная температура, увеличение лимфоузлов                  Боли в костях</p> <p>Быстрое увеличение массы тела, почечная недостаточность</p> <p><b>Симптомы, указывающие на синдром лизиса опухоли</b>                  Окрашивание мочи                  Уменьшение количества выделяемой мочи                  Боль в боку под рёбрами</p>
<p><b>Как предотвратить побочные явления?</b></p>	
<p>Вес</p>	<p>При расстройствах пищеварения регулярно <b>проверяйте</b> свой вес.</p>
<p><b>Как адаптировать свою диету?</b></p>	
<p>Диарея</p>	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы.</p> <p><b>Избегайте</b> употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя.</p> <p><b>Пейте</b> много воды: если возможно, 2 литра в день.</p>
<p>Тошнота</p>	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. <b>Ограничьте</b> потребление жирной, жареной и острой пищи.</p>
<p>Потеря аппетита</p>	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> более калорийной диеты и «диеты удовольствия».</p>
<p>Нарушения вкусового восприятия</p>	<p><b>Делайте выбор в пользу</b> нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день.</p> <p><b>Избегайте</b> употребления металлических кухонных принадлежностей.</p>

