



ЭРДАФИТИНИБ - БАЛВЕРСА®

Что такое БАЛВЕРСА

Название препарата	Описание
Эрдафитиниб	Круглые таблетки дозировкой 3 мг (жёлтые), 4 мг (оранжевые) и 5 мг (коричневые) 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. таблетокмг один раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

Принимать в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу, её можно принять в течение 12 часов. Однако в случае рвоты не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Без перерыва	

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно только в больничной аптеке.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее.

Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, функции печени и уровня фосфатов в крови), а также мониторинг клинического состояния. (Консультируйтесь с офтальмологом каждый месяц в первые 4 месяца лечения, а затем каждые три месяца).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребенку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между БАЛВЕРСОЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

1/3

Программа ONCOLIEN [Общества онкологической фармации Франции](https://oncolien.sfpo.com) предоставляется в распоряжение в соответствии с условиями [международной лицензии 4.0 «С указанием авторства — с сохранением условий»](https://oncolien.sfpo.com). Основано на работе <https://oncolien.sfpo.com>.

Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, можно получить на сайте <https://www.sfpo.com>.

Пример: При приёме БАЛВЕРСЫ® избегайте употребления сока грейпфрута, зверобоя и красного дрожжевого риса.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления	
Самые распространённые	Проблемы с глазами: проблемы со зрением, снижение зрения, сухость Отклонения в результатах лабораторных анализов: повышение уровня фосфатов в крови, креатининемия, снижение уровня гемоглобина (анемия), нарушения функции печени Нарушения пищеварения: запор, тошнота, диарея, боль в животе, воспаления во рту (стоматит), потеря аппетита, нарушение или потеря вкусового восприятия (и обоняния), увеличение веса Ногти: паронихия (инфекция ногтей), деформация, изменение цвета, отслоение ногтей Боль: в мышцах (миалгия), в суставах (артралгия) Проблемы с кожей: сухость кожи, воспаление ладоней, ступней и участков трения Общие проблемы: усталость, потеря аппетита, потеря веса
О чём следует сообщать медицинскому персоналу?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Проблемы с глазами Боль в глазах, слезотечение или покраснение, нечёткость зрения или чувствительность к свету Нарушения пищеварения Существенная и (или) быстрая потеря веса Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи Сильная боль в животе Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов Стул реже 3 раз в неделю Мышечные расстройства Необычная и необъяснимая боль в мышцах
Как предотвратить побочные явления?	
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щётку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Ногти	Избегайте травм ногтей на руках и ногах. Не используйте лак для ногтей, если только это не защитный лак, который был специально рекомендован вам медицинской группой. Делайте выбор в пользу прямой формы ногтей и не подстригайте ногти слишком коротко.
Уход за кожей	На кистях рук и стопах: Наносите на кисти рук и стопы увлажняющий крем или лосьон, и (или) заживляющий крем (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Тело: Используйте для умывания мягкое мыло и увлажняющее средство, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу.
Глаза	Избегайте носить контактные линзы. Регулярно используйте искусственные слёзы (в идеале — каждые 2 часа в период работы). Избегайте водить машину при слабой освещённости.



Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Как адаптировать свою диету?	
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте много воды.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте много воды.
Нарушения вкусового восприятия	Делайте выбор в пользу нескольких небольших приёмов тёплой и холодной пищи в день. Избегайте употребления металлических кухонных принадлежностей.
Воспаление во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.
Повышение уровня фосфатов в крови	Контролируйте потребление фосфатов на уровне 600–800 мг/сутки (основные пищевые источники фосфора : особенно следует помнить о молоке, шоколаде, яйцах, орехах и семенах, рыбе, субпродуктах (в особенности печени), мясе и газированных напитках).

