



ЕРДАФІТІНІБ - БАЛВЕРСА®

Що таке БАЛВЕРСА

Назва препарату	Опис
Ердафітиніб	Круглі пігулки дозою 3 мг (жовті), 4 мг (помаранчеві) та 5 мг (коричневі) 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто пігулок мг 1 раз на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розжовуючи та не розчиняючи пігулки.

Приймати в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу, її можна прийняти протягом 12 годин. У разі блювоти не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу наступного прийому.

Дозування – схема приймання

Приймати один раз на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі	  
Без перерви	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні тільки в лікарняній аптеці.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові, функції печінки та рівня фосфатів у крові), а також клінічний нагляд (звертайтеся до офтальмолога щомісяця протягом перших 4 місяців лікування, а потім — раз в три місяці).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між БАЛВЕРСОЮ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.



Приклад: При прийманні БАЛВЕРСИ® слід уникати вживання грейпфрутового соку, зв'язаною та червоних рисових дріжджів.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища	
Найбільш поширені	Проблеми з очима: погіршення зору, зниження гостроти зору, сухість Відхилення в результатах лабораторних досліджень: підвищення рівня фосфатів у крові, креатиніну, зниження рівня гемоглобіну (анемія), порушення показників функції печінки Порушення травлення: закріп, нудота, діарея, біль у животі, запалення в роті (стоматит), втрата апетиту, порушення або втрата смаку (та нюху), збільшення ваги Нігті: пароніхія (інфекція нігтів), деформація, зміна кольору, відшарування нігтів Біль: у м'язах (міалгія), у суглобах (артралгія) Проблеми зі шкірою: сухість шкіри, запалення долонь, підшав та ділянок тертя Загальні розлади: втома, втрата апетиту, втрата ваги
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Проблеми з очима Біль в очах, слюзотеча чи почервоніння, нечіткість зору або чутливість до світла Порушення травлення Суттєва та (або) швидка втрата ваги Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі Сильний біль у животі Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин Випорожнення рідше 3 разів на тиждень М'язові розлади Незвичайний і незрозумілий біль у м'язах
Як запобігти побічним явищам?	
Гігієна порожнини рота	Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Нігті	Уникайте травм нігтів на руках та ногах. Не використовуйте лаки, за винятком захисного лаку, спеціально рекомендованого медперсоналом. Робіть вибір на користь прямої форми нігтів і не підстригайте нігті надто коротко.
Догляд за шкірою	На кистях рук і стопах: Наносьте на кисті рук і стопи зволожуючий крем або лосьйон, і (або) загоючий крем (не втираючи сильно). Уникайте піддавати кисті рук і ступні дії високих температур (гарячої води). Уникайте видів діяльності, які спричиняють натирання або пошкодження шкіри. Уникайте носити занадто тісний одяг, шкарпетки та взуття. Тіло: Використовуйте для умивання м'яке мило та зволожувальний засіб, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру.
Очі	Уникайте контактних лінз. Регулярно використовуйте штучні слюзи (в ідеалі – кожні 2 години під час роботи). Уникайте водити машину при слабкій освітленості.



Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Як адаптувати свою дієту?	
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Закріп	Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте більше води.
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Порушення смакового сприйняття	Робіть вибір на користь кількох невеликих прийомів теплої та холодної їжі на день. Уникайте вживання металевого кухонного приладдя.
Запалення у роті (виразки)	Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.
Підвищення рівня фосфатів у крові	Контролюйте споживання фосфатів на рівні 600–800 мг/добу (основні харчові джерела фосфору: звертайте особливу увагу на молоко, шоколад, яйця, горіхи та насіння, рибу, субпродукти (особливо печінку), м'ясо та газовані напої).

