



ЭТОПОЗИД - ЦЕЛЛТОП®

Что такое ЦЕЛЛТОП

Название препарата	Описание
Этопозид	<p>Мягкая капсула 25 мг Мягкая капсула 50 мг</p> 

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. капсул 25 мг и капсул 50 мг, принимать раз/день.

Цикл продолжается недель, ЦЕЛЛТОП® нужно принимать в течение... последовательных дней, затем сделать перерыв на дней.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не открывая и не растворяя капсулы.

Принимать в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу или в случае рвоты, не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

2 или 3 раза в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Принимать в течение 21 последовательного дня каждые 28 дней (пауза 7 дней)	 J1 ...  J21  J22 ...  J28
Принимать в течение 3 - 5 дней каждые 28 дней	 J1 ...  J5  J6 ...  J28
Принимать в течение 3 - 5 дней каждые 21 день	 J1 ...  J5  J6 ...  J21

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в местных аптеках.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови перед началом каждого цикла и функции печени), а

1/3



Программа ONCOLIEN [Общества онкологической фармации Франции](https://oncolien.sfpo.com) предоставляется в распоряжение в соответствии с условиями [международной лицензии 4.0 «С указанием авторства — с сохранением условий»](https://oncolien.sfpo.com). Основано на работе <https://oncolien.sfpo.com>.

Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, можно получить на сайте <https://www.sfpo.com>.

также мониторинг клинического состояния (артериальное давление).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребёнку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ЦЕЛЛТОПОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ЦЕЛЛТОПА® избегайте употребления маслин.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления	
Самые распространённые	<p>Отклонения в результатах лабораторных исследований: низкий уровень гемоглобина (анемия), низкое содержание белых кровяных телец (лейкопения), многоядерных нейтрофилов (нейтропения) и тромбоцитов (тромбоцитопения), отклонение от нормы функции печени</p> <p>Нарушения пищеварения: боль в животе, потеря веса, запор, тошнота, рвота, диарея, воспаление во рту (язвы)</p> <p>Проблемы с кожей: выпадение волос, зуд, кожная сыпь, кожная пигментация</p> <p>Прочее: усталость, недомогание, головокружения</p> <p>Нарушения работы сердца, гипертония</p>
Пациенты, требующие особого внимания	Пациенты с непереносимостью фруктозы

О чём следует сообщать медицинскому персоналу?

Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	<p>Нарушения пищеварения Существенная и (или) быстрая потеря веса Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи Сильная боль в животе Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов Стул реже 3 раз в неделю</p> <p>Симптомы, свидетельствующие об инфекции Температура > 38,5 °C Кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании, диарея с повышенной температурой</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о кровоизлиянии Кровь в стуле или в рвотных массах Гематомы (синяки), носовые кровотечения</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о гипертонии Головные боли, шум в ушах и (или) головокружения Увеличение показателей артериального давления</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца Одышка, учащённое сердцебиение, боль или стеснение в груди</p> <p>Респираторные заболевания Постоянный усиливающийся кашель или затруднённое дыхание</p> <p>Симптомы, свидетельствующие о синдроме лизиса опухоли Изменение цвета мочи Уменьшение количества выделяемой мочи Боль в боку под рёбрами</p> <p>Проблемы с кожей Появление крупных волдырей или сильное отслаивание кожи</p>
--	--

Как предотвратить побочные явления?



Инфекция	Избегайте посещать места повышенного риска (скопление людей, контакт с больными людьми...). Вам может быть рекомендована вакцинация от гриппа и от пневмококковой инфекции: она Вас защитит.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес .
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Кровотечения, кровоизлияния	Избегайте принимать противовоспалительные средства (ибупрофен, аспирин...) Сообщите своему врачу: о приёме <i>антикоагулянтов или тромбоцитарных антиагрегантов</i> : необходим тщательный мониторинг; о случаях <i>хирургического или стоматологического вмешательства</i> .
Выпадение волос	Подстригите волосы. Узнайте относительно париков и того, как возмещается их стоимость. Используйте небольшое количество мягкого шампуня (для младенцев). Делайте выбор в пользу мягкой щётки. Избегайте слишком частого мытья волос. Избегайте источников тепла (фена, нагретых бигуди, горячего разглаживающего утюжка), красителей, мелирования и химической завивки.
Запор	Для стимулирования кишечного транзита занимайтесь подобранной и регулярной физической нагрузкой: ходьба, плавание, езда на велосипеде, спорт...
Как адаптировать свою диету?	
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Потеря веса	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте много воды.
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте много воды.
Воспаление во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.

