



ЕТОПОЗИД - ЦЕЛЛТОП®

Що таке ЦЕЛЛТОП

Назва препарату	Опис
Етопозид	М'яка капсула 25 мг М'яка капсула 50 мг 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке:..... мг/день, тобто капсул 25 мг та капсул 50 мг, приймати разів на день.

Цикл продовжується тижнів, ЦЕЛЛТОП® слід приймати протягом днів підряд, після чого зробити перерву на днів.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відкриваючи та не розчиняючи капсули.

Приймати в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

2 чи 3 рази на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі			
Приймати 21 день підряд через кожні 28 днів (7 днів перерви)	 J1 ...  J21	 J22 ...  J28	
Приймати від 3 до 5 днів через кожні 28 днів	 J1 ...  J5	 J6 ...  J28	
Приймати від 3 до 5 днів через кожні 21 день	 J1 ...  J5	 J6 ...  J21	

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові перед початком кожного циклу та функція печінки), а також моніторинг

клінічного стану (артеріальний тиск).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ЦЕЛЛТОПОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ЦЕЛЛТОПУ® слід уникати вживання оливков.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища	
Найбільш поширені	Відхилення в результатах лабораторних досліджень: зниження рівня гемоглобіну (анемія), зниження кількості білих кров'яних тілець (лейкопенія), зниження кількості багатоядерних нейтрофілів (нейтропенія) та тромбоцитів (тромбоцитопенія), відхилення від норми печінкових проб Порушення травлення: біль у животі, втрата ваги, закріп, нудота, блювання, діарея, запалення у роті (виразки) Проблеми зі шкірою: випадіння волосся, свербіж, шкірний висип, пігментація шкіри Інше: стомленість, нездужання, запаморочення Порушення функції серця, гіпертонія
Пацієнти, які потребують особливої уваги	Пацієнти з непереносимістю фруктози
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Порушення травлення Суттєва та (або) швидка втрата ваги Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу Біль у роті або виразки, що перешкоджають нормальному прийому їжі Сильний біль у животі Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин Випорожнення рідше 3 разів на тиждень Симптоми, що свідчать про інфекцію Температура > 38,5 °C Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою Симптоми, що свідчать про крововилив Кров у випорожненні чи у блювотних масах Гематоми (синці), носові кровотечі Симптоми, що свідчать про гіпертонію Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення Збільшення показників артеріального тиску Симптоми, що свідчать про порушення роботи серця Задишка, прискорене серцебиття, біль або стиснення в грудях Респіраторні захворювання Постійний посилюючий кашель чи утруднене дихання Симптоми, що свідчать про синдром лізису Фарбування сечі Зменшення кількості сечі, що виділяється Біль у боці під ребрами Проблеми зі шкірою Поява великих пухирів або сильне лущення шкіри
Як запобігти побічним явищам?	

Інфекція	Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить.
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу .
Стомленість	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Гігієна порожнини рота	Використовуйте м'яку зубну щітку, використовуйте ополаскувачі для рота, що містять питну соду. Уникайте ополіскувачів для рота, що містять ментол або спирт.
Кровотечі, крововиливи	Уникайте приймати протизапальні засоби (ібупрофен, аспірін...) Повідомте свого лікаря: якщо Ви приймаєте <i>антикоагулянти або тромбоцитарні антиагреганти</i> : необхідний ретельний моніторинг; про випадки <i>хірургічного чи стоматологічного</i> втручання.
Випадання волосся	Підстрижіть волосся. Дізнайтеся щодо перук і про те, як відшкодовується їх вартість. Використовуйте невелику кількість м'якого шампуню (для немовлят). Робіть вибір на користь м'якої щітки. Уникайте занадто частого миття волосся. Уникайте джерел тепла (фена, нагрітих бігуді, гарячого утюжка), барвників, мелірування та хімічної завивки.
Закріп	Для стимулювання кишкового транзиту займайтеся підібраними та регулярними видами фізичного навантаження: ходьба, плавання, їзда на велосипеді, спорт...
Як адаптувати свою дієту?	
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Втрата ваги	Робіть вибір на користь більш калорійної дієти та «дієти задоволення».
Закріп	Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте більше води.
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте більше води.
Запалення у роті (виразки)	Уникайте вживання кислої, клейкої та дуже солоної їжі.

