



ЛАРОТРЕКТИНІБ - ВІТРАКВІ®

Що таке ВІТРАКВІ

Назва препарату	Опис
Ларотректиніб	Желатинова капсула 25 мг: біла, матова (18 мм в довжину x 6 мм в ширину) Желатинова капсула 100 мг: біла, матова (22 мм в довжину x 7 мм в ширину) Розчин для перорального застосування: від безбарвного до жовтого, помаранчевого, червоного або коричнюватого кольору, флакон 50 мл

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

В Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто капсул мг 2 рази на день, щодня.

В Вашому випадку дозування таке: мг/день, тобто мл 2 рази на день, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не відчиняючи капсули.

Приймати в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу або у разі блювання, не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

2 рази на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі	  
Без перерви	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ВІТРАКВІ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: Слід уникати вживання грейпфрута та звіробою.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища



Найбільш поширені	Відхилення в результатах аналізу крові: низький рівень гемоглобіну (анемія), зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенія) та багаторядних нейтрофілів (нейтропенія) Порушення травлення: закріп, нудота, діарея, порушення смакового сприйняття, збільшення ваги Біль: у м'язах (міалгія) Відхилення у результатах лабораторних досліджень: відхилення від норми печінкових проб (АсАТ, АлАТ) Інше: запаморочення, порушення ходи
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Симптоми, що свідчать про інфекцію Температура > 38,5 °C Кашель, біль у горлі, біль при сечовипусканні, діарея з підвищеною температурою Порушення травлення Суттєва та (або) швидка втрата ваги Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин
Як запобігти побічним явищам?	
Інфекція	Уникайте відвідувати місця підвищеного ризику (скупчення людей, контакт із хворими людьми...). Вам може бути рекомендовано щеплення від грипу та від пневмококової інфекції: воно Вас захистить.
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу.
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте багато води.
Нудота	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Порушення смакового сприйняття	Робіть вибір на користь кількох невеликих прийомів теплої та холодної їжі на день. Уникайте вживання металевого кухонного приладдя.

