



ЛОРЛАТИНИБ - ЛОРВИКВА®

Что такое ЛОРВИКВА

Название препарата	Описание
Лорлатиниб	Таблетка 25 мг: светло-розовая, круглая Таблетка 100 мг: тёмно-розовая, овальная

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. таблеток мг, 1 раз в день, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая, не разжёвывая и не растворяя таблетки.

Принимать в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу, её можно принять в течение 4 часов. Однако в случае рвоты не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Без перерыва	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в местных аптеках.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови, уровня холестерина, уровня глюкозы в крови, электролитов, включая калий, функции печени, поджелудочной железы и почек), а также мониторинг клинического состояния (электрокардиограмма, частота сердечных сокращений, артериальное давление).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребёнку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы, противозачаточные таблетки в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между ЛОРВИКВОЙ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме ЛОРВИКВЫ® следует избегать употребления больдо, фукуса, азиатского женьшеня, померанца, пассифлоры, одуванчика.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему

1/3



Программа ONCOLIEN Общества онкологической фармации Франции предоставляется в распоряжение в соответствии с условиями международной лицензии 4.0 «С указанием авторства — с сохранением условий». Основано на работе <https://oncolien.sfpo.com>.

Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, можно получить на сайте <https://www.sfpo.com>.

препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления	
Самые распространённые	Отклонения в результатах лабораторных исследований: нарушения липидного профиля (гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия), повышение уровня глюкозы в крови (гипергликемия), снижение уровня гемоглобина (анемия) Неврологические проблемы: нарушения чувствительности (онемение, покалывание, ощущение ползания мурашек по телу), ощущение жжения или удара током, боль при холоде, при жаре и при изменении температуры, когнитивные нарушения (трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, дезориентация, спутанность сознания), расстройства настроения Нарушения пищеварения: диарея, тошнота, запор Общие: усталость, отёчность в ногах и (или) руках (отёки) Боли: головные боли, боли в суставах, боли в мышцах Прочее: проблемы со зрением, кожные высыпания, гипертония
Пациенты, требующие особого внимания	Пациенты с повышенным уровнем холестерина Больные сахарным диабетом Пациенты с заболеваниями сердца Пациенты с непереносимостью лактозы
О чём следует сообщать медицинскому персоналу?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Неврологические проблемы: Нарушения моторики и координации Аномальные ощущения, такие как покалывание, ощущение мурашек по телу Потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, трудности с речью Головокружения Нарушения настроения: тревожность, раздражительность, эйфория, депрессия, перепады настроения, агрессивность Нарушения пищеварения: Существенная и (или) быстрая потеря веса Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки Сильная боль в животе Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов Стул реже 3 раз в неделю Ухудшение кожного заболевания: Боль или воспаление в кистях рук и стопах Респираторные заболевания: Усиление продолжительного кашля или затруднённое дыхание Боли, мешающие Вашим обычным занятиям: Головные боли Боли в суставах или мышцах Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца: Потеря сознания, учащённое сердцебиение Симптомы, свидетельствующие о гипертонии: Головные боли, шум в ушах и (или) головокружения Увеличение показателей артериального давления
Как предотвратить побочные явления?	
Вес	При расстройствах пищеварения или отёках регулярно проверяйте свой вес.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.



Уход за кожей	<u>На кистях рук и стопах:</u> Наносите на кисти рук и стопы увлажняющий крем или лосьон, и (или) заживляющий крем (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. <u>Тело:</u> Используйте для умывания мягкое мыло и увлажняющее средство, осушайте кожу промокающим. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. <u>Для защиты от солнца</u> используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Боль в суставах	Занимайтесь подобранными видами физической нагрузки.
Глаза	Избегайте носить контактные линзы. Избегайте водить машину при слабой освещённости.
Отеки	Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Кладите ноги в возвышенное положение. Регулярно проверяйте свой вес.
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление. Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Как адаптировать свою диету?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте много воды.
Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте много воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Потеря веса	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Нарушение функции поджелудочной железы	Избегайте употребления алкоголя.