



РЕЛУГОЛІКС - ОРГОВІКС®

Що таке ОРГОВІКС

Назва препарату	Опис
Релуголікс	Пігулка 120 мг 

Як треба приймати Ваші ліки?

Дозування Ваших ліків визначив Ваш лікар.

У Вашому випадку дозування таке: в перший день 360 мг, тобто 3 пігулки 120 мг, прийняти за один прийом, а потім 120 мг/день, тобто 1 пігулка, щодня.

Ковтати цілком, запиваючи склянкою води, не подрібнюючи, не розрізаючи, не розчиняючи пігулки.

Приймати в один і той самий час, з їжею чи без їжі.

Якщо Ви забули прийняти дозу, її можна прийняти протягом 12 годин. Однак у разі блювання не приймайте додаткову дозу, а дочекайтеся часу прийому наступної дози.

Дозування – схема приймання

Один раз на день, в один і той самий час, з їжею чи без їжі	  
Без перерви	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

Як отримувати запас препарату?

Ці ліки доступні в місцевих аптеках.

Для їх отримання може знадобитися час. Будьте уважні та замовляйте ліки заздалегідь.

Зберігайте цей препарат в оригінальній упаковці, далеко від джерел тепла та вологи.

Що ще треба знати?

Запобіжні заходи та моніторинг

При прийманні Ваших ліків необхідно проводити лабораторні дослідження (аналіз крові для моніторингу кількісних показників складу крові та функції печінки), а також моніторинг клінічного стану (електрокардіограма).

Застосування протизаплідних засобів

Цей препарат може завдати шкоди майбутній дитині. Протягом усього періоду лікування та один місяць після його завершення Вам та Вашому партнеру необхідно застосовувати ефективні методи контрацепції (презервативи у поєднанні з іншим методом).

Взаємодія з іншими ліками та (або) їжею

Виникнення взаємодій між ОРГОВІКСОМ® та Вашими іншими видами лікування може мати шкідливі наслідки (зниження ефективності та переносимості препарату). Важливо повідомити свого фармацевта та лікаря про всі ліки та (або) інші речовини (харчові продукти, рослини, пробіотики, ефірні масла, харчові добавки тощо), яких Ви вживаєте.

Приклад: При прийманні ОРГОВІКСА® слід уникати вживання звіробію.

Які є можливі побічні явища?

Нижче перелічені найпоширеніші побічні явища. Можливі інші побічні явища. Для отримання додаткової інформації прочитайте анотацію до свого препарату або зверніться за порадою до свого лікаря чи фармацевта.

Побічні явища	
Найбільш поширені	Порушення травлення: діарея, закріп, нудота, блювання, втрата ваги Серцево-судинні розлади: гіпертонія, приливи Проблеми зі шкірою: висип Відхилення в результатах аналізу крові: низький рівень гемоглобину (анемія), порушення функції печінки Інше: біль у суглобах, втомлюваність
Про що слід повідомляти медичному персоналу?	
Слід повідомляти медичному персоналу за наявності наступних станів та за відсутності конкретних медичних рекомендацій	Порушення травлення: Суттєва та (або) швидка втрата ваги Дуже часта діарея, випорожнення понад 4 рази на добу Не в змозі пити протягом 24 годин та (або) приймати їжу протягом приблизно 48 годин Випорожнення рідше 3 разів на тиждень Симптоми гіпертонії: Головний біль, шум у вухах та (або) запаморочення Проблеми зі шкірою: Поява значних пухирів або сильне відшарування шкіри Біль, що заважає Вам займатися своєю звичайною діяльністю: Біль у суглобах
Як запобігти побічним явищам?	
Вага	При розладах травлення регулярно перевіряйте свою вагу.
Приливи	Займайтеся підібраними видами фізичного навантаження. Уникайте джерел тепла.
Догляд за шкірою	Використовуйте для умивання м'яке мило та зволожувальний засіб, підсушуйте шкіру промоканням. Уникайте використання будь-яких продуктів, що дратують шкіру. <i>Для захисту від сонця використовуйте</i> крем із сонцезахисним фільтром широкого спектру та уникайте впливу сонячних променів.
Біль у суглобах	Займайтеся підібраними видами фізичного навантаження.
Втомлюваність	Робіть вибір на користь занять, що сприяють доброму самопочуттю, зокрема на користь підбраного та регулярного фізичного навантаження: ходьба, робота в саду, плавання, їзда на велосипеді, спорт... Чергуйте періоди активності та відпочинку.
Як адаптувати свою дієту?	
Діарея	Робіть вибір на користь дієти з низьким вмістом клітковини. Найкраще вживати продукти, що містять крохмаль, моркву, банани. Уникайте вживання сирих фруктів та овочів, молочних продуктів, кави та алкоголю. Пийте багато води.
Закріп	Робіть вибір на користь дієти з високим вмістом клітковини. Пийте багато води.



Нудота, блювання	Робіть вибір на користь дрібного харчування з кількох легких прийомів їжі, рідких та холодних страв. Обмежте споживання жирної, смаженої та гострої їжі.
Приливи	Уникайте вживання гострої їжі з алкоголем або кофеїном. Пийте холодні напої та у великій кількості.