



РИПРЕТИНИБ - КИНЛОК®

Что такое КИНЛОК

Название препарата	Описание
Рипретиниб	Таблетка 50 мг

Как нужно принимать Ваше лекарство?

Дозировку Вашего лекарства определил Ваш врач.

В Вашем случае дозировка такова: мг/день, т.е. таблеток мг, принимать за один приём, каждый день.

Глотать целиком, запивая стаканом воды, не измельчая, не разрезая и не растворяя таблетки.

Принимать в одно и то же время, с едой или без еды.

Если Вы забыли принять дозу, её можно принять в течение 8 часов. Однако в случае рвоты не принимайте дополнительную дозу, а дождитесь времени приёма следующей дозы.

Дозировка – схема приёма

Один раз в день, в одно и то же время, с едой или без еды	  
Без перерыва	 J1  J2  J3  J4  J5  J6  J7 ...  J28

Как получать запас препарата?

Это лекарство доступно в местных аптеках.

Для его получения может потребоваться время. Будьте внимательны и заказывайте лекарство заранее. Храните этот препарат в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и влаги.

Что ещё нужно знать?

Меры предосторожности и мониторинг

При приёме Вашего лекарства необходимо проводить лабораторные исследования (анализ крови для мониторинга количественных показателей состава крови), а также мониторинг клинического состояния (дерматологическое обследование, измерение артериального давления, кардиологическое обследование).

Применение противозачаточных средств

Этот препарат может нанести вред будущему ребёнку. В течение всего периода лечения и одного месяца после его прекращения Вам и Вашему партнёру необходимо применять эффективные методы контрацепции (презервативы в сочетании с другим методом).

Взаимодействие с другими лекарствами и (или) едой

Возникновение взаимодействий между КИНЛОКОМ® и Вашими другими видами лечения может иметь вредные последствия (снижение эффективности и переносимости препарата). Важно сообщить своему фармацевту и врачу обо всех лекарствах и (или) других веществах (пищевых продуктах, растениях, пробиотиках, эфирных маслах, пищевых добавках и т. д.), которые Вы употребляете.

Пример: При приёме КИНЛОКА® избегайте употребления зверобоя и грейпфрутового сока.

Каковы возможные побочные явления?

Ниже перечислены наиболее распространённые побочные явления. Возможны другие побочные явления. Для получения дополнительной информации прочитайте аннотацию к своему препарату или обратитесь за советом к своему врачу или фармацевту.

Побочные явления



Самые распространённые	Нарушения пищеварения: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запор, воспаление во рту (язвы), потеря аппетита Проблемы с кожей: воспаление ладоней, ступней ног и участков трения (синдром «рука-нога»), сухость, зуд, выпадение волос, замедленное заживление ран Прочее: гипертония, боль в мышцах и суставах, усталость
О чём следует сообщать медицинскому персоналу?	
Следует сообщать медицинскому персоналу о наличии следующих состояний и при отсутствии конкретных медицинских рекомендаций	Нарушения пищеварения Существенная и (или) быстрая потеря веса Очень частая диарея, стул более 4 раз в сутки Стул реже 3 раз в неделю Сильная боль в животе Боль во рту или язвы, препятствующие нормальному приёму пищи Не в состоянии пить в течение 24 часов и (или) есть в течение примерно 48 часов Симптомы гипертонии Головные боли, шум в ушах и (или) головокружение Увеличение показателей артериального давления Симптомы, свидетельствующие о нарушении работы сердца Одышка, сильное сердцебиение или боль или стеснение в груди
Как предотвратить побочные явления?	
Контроль за давлением	Необходимо откорректировать повышенное давление. Рекомендуется регулярно измерять артериальное давление. Фармацевты могут помочь Вам измерить давление. Вы также можете попросить сделать это самостоятельно с помощью автоматического тонометра.
Уход за кожей	На кистях рук и стопах: Наносите на кисти рук и стопы увлажняющий крем или лосьон, и (или) заживляющий крем (не втирая сильно). Не подвергайте кисти рук и стопы воздействию высоких температур (горячей воды). Избегайте действий, которые вызывают трение или повреждение кожи. Избегайте слишком тесной одежды, носков и обуви. Тело: Используйте для умывания мягкое мыло и увлажняющее средство, осушайте кожу промоканием. Избегайте использования каких бы то ни было продуктов, раздражающих кожу. Для защиты от солнца используйте крем с солнцезащитным фильтром широкого спектра и избегайте воздействия солнечных лучей.
Гигиена полости рта	Используйте мягкую зубную щетку, используйте ополаскиватели для рта, содержащие питьевую соду. Избегайте ополаскивателей для рта, содержащих ментол или спирт.
Усталость	Делайте выбор в пользу занятий, способствующих хорошему самочувствию, в частности в пользу подобранной и регулярной физической нагрузки: ходьба, работа в саду, плавание, езда на велосипеде, спорт... Чередуйте периоды активности и отдыха.
Вес	При расстройствах пищеварения регулярно проверяйте свой вес.
Как адаптировать свою диету?	
Диарея	Делайте выбор в пользу диеты с низким содержанием клетчатки. Предпочтительно употреблять продукты, содержащие крахмал, морковь, бананы. Избегайте употребления сырых фруктов и овощей, молочных продуктов, кофе и алкоголя. Пейте больше воды.

Запор	Делайте выбор в пользу диеты с высоким содержанием клетчатки. Пейте больше воды.
Тошнота	Делайте выбор в пользу дробного питания из нескольких лёгких приёмов пищи, жидких и холодных блюд. Ограничьте потребление жирной, жареной и острой пищи.
Потеря аппетита	Делайте выбор в пользу более калорийной диеты и «диеты удовольствия».
Воспаление во рту (язвы)	Избегайте употребления кислой, клейкой и очень солёной пищи.

